

Центральноукраїнський національний технічний університет
Центр заочної та дистанційної освіти
Кафедра загального землеробства

«Допущено до захисту»
Зав. кафедрою загального землеробства,
к.б.н., професор
_____ Микола Мостіпан
« ____ » _____ 2021 р.

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

на тему:

Врожайність сортів пшениці озимої в Лісостепу України

Виконав здобувач вищої освіти
II курсу, групи АГ 20МЗ
ОПП «Агрономія»
спеціальності 201 «Агрономія»
_____ Кінша О.М.
« ____ » _____ 2021 р.
Керівник, к.с.-г.н.
_____ Віталій Іщенко
« ____ » _____ 2021 р.

Рецензент
_____ Тетяна Соколюк
« ____ » _____ 2021 р.

м.Кропивницький

Центральноукраїнський національний технічний університет
Центр заочної та дистанційної освіти
Кафедра загального землеробства
Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Галузь знань: 20 Аграрні науки та продовольство
Спеціальність: 201-Агрономія
Освітньо-професійна програма: Агрономія

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри загального
землеробства

_____Микола Мостіпан
“ ” _____ 2021 року

ЗАВДАННЯ
НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ
ЗА ДРУГИМ (МАГІСТЕРСЬКИМ) РІВНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ЗДОБУВАЧУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Кінші Олександрі Миколаївні

1. Тема роботи Врожайність сортів пшениці озимої в Лісостепу України
2. Керівник роботи Іщенко В.А., кандидат сільськогосподарських наук, професор затверджений наказом ЦНТУ “ 02 ”серпня 2021 року № 49 - 13
3. Строк подання роботи до захисту 3 грудня 2021 року
4. Мета та завдання випускної кваліфікаційної роботи. Визначити реакцію сортів пшениці озимої на умови її вирощування.

Завдання:

- вивчити куцистість рослин досліджуваних сортів пшениці озимої на час припинення осінньої вегетації;
- визначити показники щільності посівів досліджуваних сортів пшениці озимої на час припинення осінньої вегетації;
- вивчити врожайність досліджуваних сортів пшениці озимої після різних попередників.

5.Консультанти по роботі, із зазначенням розділів роботи

Розділ	Прізвище, ініціали та посада консультанта	Підпис, дата	
		завдання видав	завдання прийняв
Охорона праці та довкілля	Дейкун В.А., доцент		
Економічне обґрунтування результатів досліджень	Малаховська В.А., викладач		

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ П/П	Назва етапів кваліфікаційної роботи	Строк виконання етапів роботи	Примітка
1.	Огляд наукової літератури, охорона праці та довкілля	11.10.2021 р.	
2.	Місце та умови проведення досліджень	11.10.2021 р.	
3.	Результати досліджень та їх аналіз	15.11.2021 р.	
4.	Економічне обґрунтування результатів досліджень	22.11.2021 р.	
5.	Висновки, список літератури, вступ.	3.12.2021 р.	

Дата видачі завдання

« 2 » серпня 2021 р.

Підпис керівника

_____Віталій Іщенко

Завдання прийнято до виконання

« 1 » вересня 2021 р.

Підпис здобувача

_____Кінша О.М.

ЗМІСТ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ РІЗНИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ	
ВСТУП.....	6
РОЗДІЛ 1. РОЛЬ СОРТІВ У ПІДВИЩЕННІ ВРОЖАЙНОСТІ ПШЕНИЦІ	
ОЗИМОЇ (огляд літератури).....	8
1.1. Поширення, господарське значення та морфобіологічна характеристика пшениці озимої.....	9
1.2. Роль генетичних ресурсів в підвищенні врожайності пшениці озимої.....	15
РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА МІСЦЯ ТА УМОВ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ДОСЛІДУ.....	17
2.1. Організаційно-економічна характеристика місця та умов проведення досліджень.....	17
2.2. Ґрунтово-кліматичні ресурси досліджуваного району та їх значення у формуванні врожайності пшениці озимої.....	19
РОЗДІЛ 3. ВРОЖАЙНІСТЬ СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В ЦЕНТРАЛЬНІЙ УКРАЇНІ.....	26
3.1. Методика проведення досліджень.....	26
3.2. Врожайність сортів пшениці озимої після різних попередників.....	33
РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ РІЗНИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ.....	54
РОЗДІЛ 5. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ДОВКІЛЛЯ.....	59
5.1. Організація та функція служби охорони праці на СГП.....	59
5.2. Техніка безпеки при виконанні посівних механізованих робіт.....	60

5.3. Охорона довкілля при виконанні запропонованих робіт, агрозаходів.....	63
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ.....	65
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	68
ДОДАТКИ.....	73

ВСТУП

Актуальність теми. Щорічно по Україні відбуваються масштабні збори урожаїв озимої пшениці, утім, досягати цього стає все важче. Кліматичні зміни - ставлять завдання пошуку нових і максимально адаптивних до різних умов сортів. Одним із можливих варіантів є сорти озимої пшениці, що мають високі якісні показники та унікальні властивості: високу стійкість до основних хвороб та максимальна можливість врожаю після різних попередників.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Напрямок наукових досліджень кваліфікаційної роботи є складовою частиною наукових робіт наукового керівника.

Мета і завдання дослідження. Головна мета досліджень полягала у виділенні сортів пшениці озимої, які є найбільш придатними для вирощування в Центральній Україні.

Головними завданнями є:

- Вивчити куцистість рослин досліджуваних сортів пшениці озимої на час припинення осінньої вегетації;
- Визначити показники щільності посівів досліджуваних сортів пшениці озимої на час припинення осінньої вегетації;
- Вивчити врожайність досліджуваних сортів пшениці озимої після різних попередників;
- Дати економічну оцінку вирощування сортів пшениці озимої після різних попередників.

Наукова новизна отриманих результатів. В результаті проведених досліджень поглиблені знання щодо реакції пшениці озимої на попередники та умови росту та розвитку рослин. В умовах лісостепової зони України, зокрема Новомиргородського району Кіровоградської області, вперше досліджувалася реакція нових сортів пшениці озимої на попередники.

Практичне значення роботи. Сільськогосподарським підприємствам рекомендуємо при розміщенні пшениці озимої після озимого ріпаку та стерньового попередника використовувати сорт Даринка Київська. Умовно чистий дохід відповідно становить 23543 та 15286 грн./га, а розрахунковий рівень рентабельності відповідно 181,7 та 120,8%. Після сої на зерно рекомендуємо вирощувати сорт Золотоколоса. Його вирощування забезпечує отримання умовно чистого доходу на рівні 19615 грн/га, а розрахунковий рівень рентабельності становить 19615 грн./га.

Особистий внесок студента в наукові дослідження. Автор роботи приймала участь у проведенні польових досліджень, провела всі обліки та спостереження, систематизувала отримані результати досліджень та підготувала до захисту кваліфікаційну роботу.

Апробація результатів роботи. Зроблена доповідь на XIII Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки» (10-12 листопада 2021 р.). м. Кропивницький, ЦНТУ.

Публікації. Опублікована стаття на тему “Щільність стеблостою посівів пшениці озимої на час припинення осінньої вегетації”.

РОЗДІЛ 1. РОЛЬ СОРТІВ У ПІДВИЩЕННІ ВРОЖАЙНОСТІ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ

Пшениця має перше місце в світі за посівними площами (біля 230 млн./га) і валовим збором (понад 530 млн. т) і є однією з основних зернових культур. В Україні висівають озиму пшеницю у середньому біля 6,5 млн./га, або 40% площі всіх зернових. Поширеність цієї культури зумовлена її високою біологічною пластичністю щодо екологічних умов і, перш за все, високою поживністю зерна, з якого отримують багато харчових продуктів.

В Україні сконцентровано великий науковий потенціал і накопичено значний виробничий досвід з вирощування пшениці. Провідними установами України з цих питань є Селекційно-генетичний інститут Національний центр насіннєзнавства і сортовивчення НААН України (м. Одеса), де виведено 5 високоврожайних зимостійких і засухостійких сортів озимої м'якої пшениці степового екотипу, створено озиму тверду пшеницю сортів Мічурінка, Новомічурінка та Одеська ювілейна (урожайність – 35–45 ц з 1 га); Інститут фізіології рослин і генетики НАНУ (м. Київ); Миронівський інститут пшениці імені Ремесла НААН України (Миронівка, Київська область), тощо.

В нашій країні в Степу сконцентровано 55% площ вирощування, в Лісостепу – 35%, в Поліссі – 10%. Середня врожайність в Україні знаходиться на рівні 40–45 ц з гектара і більше, в країнах Західної Європи - від 70–80 ц з гектара. Валове виробництво зерна пшениці в Україні знаходиться на рівні більше 16,0 млн. т при споживанні 5,5 млн. т, решта - це експортний потенціал держави. [1, 5, 7, 10, 12, 13].

За даними Селекційно-генетичного інституту НЦНС [14], віддача від нового сорту спостерігається у перші 1-2 роки після його впровадження до 0,7 т/га приросту порівняно з «старими» сортами, що використовувались вже тривалий час і зарекомендували себе як оптимальний сорт для вирощування. Тому здійснення прискореної сортозаміни є дуже актуальним.

1.1. Поширення, господарське значення та морфобіологічна характеристика пшениці озимої

З удосконаленням технології вирощування нових культур більшого значення набуває знання їх фенології та морфології, особливо у виборі строків, способів та норм застосування мінеральних добрив (особливо азотних), морфорегуляторів і засобів захисту від шкідливих факторів (бур'янів, шкідників і збудників хвороб).

На сьогодні важко уявити успішне ведення сільськогосподарського виробництва без використання таких засобів інтенсифікації, як мінеральні добрива, засоби захисту й регулятори росту, які допомагають на 40–60% підвищити рівень продуктивності посівів. Проте нерегламентоване (без врахування біологічних особливостей сорту/гібриду, ґрунтово-кліматичних умов) їх використання не лише може призвести до зниження урожайності та погіршення якості продукції, а й здатне спричинити підвищення її собівартості, зробити виробництво нерентабельним і негативно вплинути на довкілля.

Рівень продуктивності зернових колосових культур визначається структурними елементами врожайності: густотою продуктивного стеблостою (кількістю продуктивних пагонів на 1 м² або 1 га), кількістю зерен в колосі та масою 1000 насінин. Ці компоненти визначають рівень урожайності.

Догляд за посівами – це цілеспрямований вплив на формування структурних елементів врожайності, зокрема й через здійснення низки агротехнічних заходів. Терміни здійснення заходів щодо догляду за посівами мають бути тісно пов'язані з процесом формування врожаю. Для визначення оптимального часу їх проведення важливо спиратися на єдину, універсальну та загальновизнану шкалу фаз росту і розвитку зернових колосових культур. В усьому світі такою вважається шкала Задокса.

Господарське значення зумовлене її поживними якостями. Склад зерна відповідає всім необхідним вимогам для задоволення потреб людини. Зерно містить: білок, крохмаль, жири, зольні речовини, вітаміни груп В, РР, Е,

провітаміни каротин, ергостерин. Калорійність 100 г пшеничного хліба з борошна вищого гатунку становить 250 ккал.

З пшениці отримують борошно вищого гатунку, вміст клітковини в якому не менше 28%. Використовується також для виготовлення концентрованих кормів, пшеничних висівок для сільськогосподарської живності. Солому в подрібненому вигляді згодовують великій рогатій худобі.

Вона є хорошим матеріалом для підстилки в хліву. Рано навесні озиму пшеницю застосовують в якості зеленого корму.

Для сівозміни вона є хорошим попередником для інших рослин.

У переробній промисловості з зерна отримують спирт, крохмаль, декстрин та ін. речовини. Солому використовують для виробництва паперу, циновок, предметів домашнього вжитку [15].

Пшениця – дуже важлива зернова культура. В світі налічують близько 15 її видів. У кожного виду є багато сортів. Зараз відомо 4000 сортів пшениці. Та всі види і сорти її мають загальні ознаки будови.

Морфологічні особливості. Озима пшениця – це однорічний представник родини Тонконогі. Злакова рослина, що розмножується зерновками.

Культура має мочкувату кореневу систему, розташовану близько до поверхні ґрунту. При підйомі зернівки з ембріона спочатку з'являється деяка кількість корінців, раз з їх ключової, який розвиненіший. Практично в одно і теж час з'являється підземний відросток з укороченими між вузлами. Стеблові вузли знаходяться досить густо. Цю групу зближених вузлів іменують вузлом кушіння. Від їх відростають допоміжні корінці, які утворюють мичкувату кореневу систему, а з бруньок - незлічені надземні пагони пшениці, коли вона кушиться. Велетенська доля коренів розвивається в орному шарі землі на глибині 20 см. Але коріння може проникати на 120-200 см в глибину.

Стебло – соломину, кругла в перетині і порожня всередині. У однієї рослини при кушінні може розвиватися від 2-4 до 12 і більше стебел. Стебло злаків росте за рахунок клітин, які діляться біля основи кожного міжвузля. Таке

зростання називають інтернейронним. Стебло розділене по всій довжині вузлами – кільцеподібними потовщеннями на 5-6 міжвузлів. Довжина кожного з ростом рослини збільшується. Товщина стебла різна: найменша вона у верхній частині, найбільша – всередині. З підземних стеблових вузлів з'являються бічні пагони.

Листя довгі, ланцетоподібні, з паралельним жилкуванням. Кількість листків та їх розмір залежать від ряду факторів: родючості ґрунту, погодних умов, сорту. В озимій пшениці вони бувають двох видів: прикореневі – утворюються з підземних вузлів; стеблові – на надземній частині рослини – від вузла відходить один лист, скручений знизу в трубочку, що охоплює частину стебла – піхва.

Суцвіття - важкий колос, який зроблено з колосового стержня і окремих колосків. Будь-який колосок містить 2 колоскових луски, а між ними від 2-ух до 7 цвітів. Квітка пшениці за власною будовою подібна на квітку іржі. У нього 2 луски кольорів замість помітної оцвітини, 3 пильовики на довгих тичинкових нитках і сидячий товкачик з 2-мя кошлатими, пір'ястими рильцями. Цвітіння відбувається з центру і поширюється одночасно вгору і вниз. Рослина самозапильна. При похмурій погоді цвітіння закрите, при сонячній – відкрите. Після цвітіння на колосках утворюються плоди – голі зернівки.

Плід пшениці – зернівка з однією сім'ядолью в насінні. Більше вагу мають пшениці жорстка і м'яка. Сім'я жорсткої пшениці непроникне. У випадку якщо його розрізати, воно поблискує, як скельце. Тверду пшеницю висівають вранішньої весни. Вона досить вимоглива до основи і клімату. А посіяне в основу сім'я пшениці вбира воду, набрякає і проростає. Потім крізь деяку кількість днів бувають помічені сходи. Коли у сходів з'являється 3-ий лист, від підземної частини стволи пшениці відростають бокові пагони. Коли починається кущіння - рослина залишається низькою, стебла непомітні. Згодом кущіння стволи починають зростати - трапляється вихід в трубку. Потім з піхви верхнього листа буває помічений колос, починається колосіння, потім -

цвітіння. Згодом від цвітіння дозріває сім'я. Виникнення сходів, кушіння, вихід в трубку, цвітіння і дозрівання - це різні фази становлення пшениці. Дозрівання зерна іменують молочною стиглістю. Збирають пшеницю при прищесті настанні воскової стиглості [15].

Біологічні особливості. Озима пшениця - одна з найбільш примхливих культур до метеорологічних умов і зовнішніх чинників - ґрунту, температури, світла. У деякі роки при аномаліях погоди може загинути істотна частка посівів. Пшениця - культура яка самозапилюється, тому запилення може відбуватися і в полеглих посівах, але число зерняток в колосі, маса 1000 зерняток зменшується та родючість знижується на 20-сорок відсотків і більше. Пшениця - холодостійка культура. Її насіння проростає при температурі $+1+2^{\circ}\text{C}$. Для отримання високоякісних сходів під час сівби зобов'язана бути температура $+14...+16^{\circ}\text{C}$. Відмінно загартовані рослини витримують в зимову пору пониження температури в зоні вузла кушіння до мінус $17-18^{\circ}\text{C}$, а високо морозостійких видів - до мінус $19-20^{\circ}\text{C}$. Пшениця вимоглива до вологи. Упродовж вегетації вологість землі зобов'язана бути у межах 65-75% меншої вологоємкості(НВ) і не знижуватися до рівня вологості розриву капілярів, тим більше до вологості в'янення рослин. Виникнення сходу озимої пшениці при хорошому зволоженні ґрунту настає при скопленні після сівби суми середньодобової температури 120 оС. Від сходів до початку кушіння озимої пшениці сума середньодобових температур прирівнюється 220 оС. Поява трьох погонів у озимої пшениці є при скопиченні суми середньодобових температур 580 оС.

Транспіраційний коефіцієнт дає 320-450. Він мініатюризується при внесенні необхідного числа фосфорно-калійних добрив, які сприяють підйому кореневої системи, і роздрібному - азотних добрив. Пшениця дуже примхлива до світла. Завдяки фотосинтезу в ній накопичуються поживні речовини. При оптимальному освітленні рослина кущиться, листя набуває стійкого зеленого кольору. При нестачі світла розростаються нижні міжвузля, лист кушіння

утворюється в нижній частині, що погіршує зимостійкість культури. Бракуюче освітлення весною вважається передумовою витягування нижніх міжвузлів і вилягання рослин. У етап дозрівання і наливання зерна не вистачає чисельності світла, що приводить до посилення негативних тенденцій властивості урожаю [15].

Культура примхлива до ґрунтів. Відмінно збільшується на окультурених структурних основах середнього механічного складу. Найкращими чорноземні і сіруваті лісові землі із звичайною реакцією ґрунтового розчину (рН 6,0-7,0).

За внесенням поживних речовин із землі озима пшениця є азотофільною рослиною: 1 ц зерна виносить в середньому із землі азоту 3,75; фосфору - 1,3; калію - 2,3 кг. У різних зонах нашої держави величезної шкоди посівам озимої пшениці наносять захворювання: бура, жовтувата, лінійна (стеблова) іржі, курна, жорстка і стеблові головешки, кореневі гнилості, снігова пліснява та ін. З шкідників більшої шкоди озимої пшениці наносять злакові мухи (гессенська, шведська, зеленоочка), дротяники, клоп-черепашка, жуккузька, хлібна жужелиця [15].

Місце культури в сівозміні. Для пшениці дуже важливі попередники і знижується врожайність при повторному вирощуванні на 15–20, а при сівбі три роки поспіль – на 30–35% і більше. Якщо не змінювати вирощування врожайність знижується і при внесенні додаткових добрив. Головна першопричина цього – поширення захворювань, шкідників і бур'янів, що почастишало. Пшеницю не йде по стопах рости не тільки згодом пшениці, але і згодом інших злакових хлібних культур (окрім кукурудзи), які мають подібних збудників захворювань, шкідників і бур'янів. Попередники зобов'язані бути непоганими порівняно з нагромадженням необхідного числа продуктивної вологості при сівбі (не найменш 10 мм в 10-сантиметровому шарі ґрунту). Ці культури зобов'язані рано вивільняти поле і не висушувати ґрунт дуже.

Непогані попередники – горох, сочевиця, чина. Не йде сіяти пшеницю після сорго, суданської трави, соняшнику, кукурудзи на сім'я, травичок другого-третього року застосування. Потрібно розташовувати на полях зайнятих парів

посівами на зелений корм і сіно, після трилисника на раз укіс, гороху, сочевиці, чини, картоплі ранешнього вживання, кукурудзи на ранешний силос, зібраній у фазі молочно-воскової стиглості не пізніше 20 днів до прищестя термінів сівби, а в посушливій південно-східній частині - ще згодом чистих парів.

Інтенсивні міцні і цінні виду пшениці більше прискіпливі до попередників, внаслідок того найкращі попередники потрібно відводити для їх вирощування. У регіонах де непогані опади в липні, серпні і вересні вірно згодом збору ранішних культур лущити поле і висівати сидерати: редьку, гірчицю.

Добриво. Зплановане мінеральне живлення озимої пшениці в напрям у періоду підйому вважається необхідним моментом формування хорошої системи посіву, регулювання високоякісного процесу.

За відомостями польових експериментів, внесення відповідну кількість мінеральних добрив, у поєднанні з активним захистом, гарантує 28-32% приросту урожаю, власне що пов'язане з найвищою чутливістю пшениці до мінерального живлення. Для продукування 6 т/га зерна з відповідним чисельністю трави вона споживає 180 кг азоту, 80 кг фосфору і 155 кг калію. Пшениця нормально реагує як на мінеральні, наприклад і на органічні добрива. Загальновизнані мірки мінеральних добрив призначають з урахуванням планової врожайності, вмісту тих, що становлять живлення в основі і інших моментів. Система добрива замислює внесення фосфорних і калійних добрив під провідний обробіток землі, а азотних - ключовим чином під час весняно-літньої вегетації. При даному, за відомостями Миронівського інституту пшениці НААН України найкращою відповідністю тих, що становлять живлення $(-000-0-)- P:K \in 1,5: 1: 1$ або ж $2,0: 1: 1$.

На чорноземах Лісостепу і Степу вносять 60-90 кг/а мінеральних добрив, з плюсом фосфору і азоту.

В цілому загальновизнаних мірок мінеральних добрив вносять з урахуванням планової врожайності, вмісту тих, що становлять живлення в

основі і інших моментів, застосовуючи, при даному, розрахункові способи, або ж нормативи витрат що становлять живлення з урахуванням спроможності землі речовинами живлення [8, 11].

1.2. Роль генетичних ресурсів в підвищенні врожайності пшениці озимої

Численні дослідження доводять, що рослини реалізують лише близько 50% свого генетичного потенціалу, якщо вони вирощуються за традиційними технологіями.

Втрати врожаю можуть бути пов'язані як з біотичними, так і з абіотичними факторами, а саме:

- Біотичні фактори: хвороби, викликані грибами, бактеріями, вірусами; ураження комахами; конкуренція з бур'янами за фактори життя.

- Абіотичні фактори: низькі показники родючості ґрунту; заболочення або посуха; зависока або занижка температура.

За останніх деяка кількість десятиків років закордонні і вітчизняні селекціонери зробили величезне чисельність нових сортів пшениці озимої південної з найвищим генетично-селекційним потенціалом врожайності, з найкращими морфоагробіологічними якостями, які більше, ніж звичайні сорти, відповідають потребам землеробів.

Сучасні види пшениці м'якої озимої мають досить піднесений генетичний потенціал продуктивності, який домагається 10-12 т/га, і перевершують старі сорти за врожайністю в 1,5-2 рази. Втім, як демонструє практика, вірогідні здібності свіжого сорту застосовуються тільки на 30-50%, знижуючись в окремі роки до 24-26%, а в деяких областях - у тому числі і до 20%. Для зіставлення: в Нідерландах потенціал видів застосовується на 70%, в Данії і Швеції - на 50-60%.

Та і в Україні останніми роками і є незмінний підйом врожайності - з 2,34 в 2008 р. до 4,21 т/га в 2018 р., зараз вона набагато нижча, ніж в розвинених державах Євросоюзу.

Щороку до Державного реєстру вносять важливу чисельність нового сорту. Станом на нинішній рік до обігу в Україні допущено в межах 400 видів пшениці павної озимої, які рекомендовані для збільшення агрокліматичних зон. Не усі вони і не в усіх підзонах, мікронах, регіонах, господарствах мають усі шанси представляти свій натуральний потенціал і створювати вищу продуктивність. Між їх тільки конкретна доля найповніше відповідає вимогам вирощування, містить вищу генетичну дієдатність і адаптивні якості. [17].

При роботі селекціонерів щодня збільшується на генному рівні фіксована прирешня врожайність видів вище 10,0 т/га, про що говорять підсумки Державного сортовипробування. Генетичний потенціал продуктивності передових видів, зроблених в Інституті фізіології рослин і генетики НАН України і Миронівському інституті пшениці імені В. М. Ремесла під управлінням академіка В. В. Моргуна сягає вище 10,0-12,4 т/га. Так, в 2009 році вид пшениці озимої Фаворитка на Черкащині на площі 136 га забезпечив отримання рекордної за усю багаторічну історію України врожайності зерна - 13,18 т/га [6].

Селекційний прогрес за останні роки увесь час зростає, а його доля в прирості врожайності зерна щодня збільшується [4]. Так, за відомостями Українського інституту експертизи сортів рослин, до 2021 року питомий авторитет приросту урожаю, придбаного за рахунок нового виду сортів, складав 70-80 % або ж в 2-3 рази вище сьогоднішнього значення [2], а за підрахунками Всесвітньої організації продовольства в 2010-2012 рр. цілий підйом виготовлення продукції рослинництва досягнуто через отримання нового сорту.

Отже, вищенаведений матеріал дозволяє стверджувати про доцільність впровадження нових сортів у сільськогосподарське виробництво. Тому напрямок досліджень кваліфікаційної роботи є актуальним, а отримані результати досліджень матимуть незаперечне практичне значення.

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА МІСЦЯ ТА УМОВ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ДОСЛІДУ

Сільське господарство є багатофакторною системою, де результати залежать від організаційних аспектів, використання ґрунтово-кліматичних умов, технічних факторів, біологічних і хімічних засобів виробництва, а також певного рівня застосування засобів механізації, від яких безпосередньо залежить активність використання всіх факторів формування врожайності сільськогосподарських культур[11].

Неможливо не погодитися з позицією, що планування заходів, спрямованих на збереження та підвищення родючості ґрунтів, може досягти успіху лише за умови, якщо воно буде засноване на основі законів розвитку родючості ґрунтів та їх взаємодії з іншими природними факторами[12].

Тому нашим завданням у цьому розділі роботи є: організаційно-господарська характеристика аналізованого суб'єкта господарювання; аналіз ґрунтово-кліматичних ресурсів господарювання; дослідження рівня екологічної чистоти та безпеки довкілля, що мають вагоме значення на формування врожайності озимої пшениці[12].

Аналізу підлягала територія Новомиргородського району Кіровоградської області.

2.1. Організаційно-економічна характеристика місця та умов проведення досліджень

Дослідження по темі кваліфікаційної роботи проводили у СТОВ “Агролан” Новомиргородського (зараз Новоукраїнський) району Кіровоградської області (Рис.2.1.).

Інформацію щодо стану земельних ресурсів району знайти практично неможливо. Тому дане питання будемо розглядати через призму Кіровоградської області загалом.

Кіровоградська область розташована в центральній частині України на межі переходу лісостепу у степ. У слідство цього її значний покрив досить строкатий і характеризується найвищою родючістю, тому що представлений переважно чорноземами, яких доводиться 95% орних територій. За мірою родючості основ Кіровоградська район займає четверту угоду в Україні, а за 100 -бальною шкалою властивості ці землі оцінені в 67 балів [44].

Земля області дає 2459,1 тис. а або ж 4,07% землі України. За площею і біопродуктивним потенціалом земляного фонду Кіровоградська район вважається однією з основних областей України, втім розораність її землетериторії, тобто відношення площі орних територій до спільної площі, складає 71,7%, власне що на 17,3% вище міра розораності по Україні. Вища міра розораності землі області, у власну чергу, обумовлений інтенсивним впровадженням територій сільськогосподарського виробництва [20].

2.2. Ґрунтово-кліматичні ресурси досліджуваного району та їх значення у формуванні врожайності пшениці озимої

Аналіз ґрунтово-кліматичних ресурсів досліджуваного регіону проводили в розрізі усієї Кіровоградської області шляхом порівняння.

Було встановлено, що загальна площа області становить 24,6 тис. км² (4,1% від території України). Протяжність області з півночі на південь становить майже 148 км, із заходу на схід – 335 км. Область розташована на південних схилах Причорноморської височини. Таке місце розташування обумовлює дуже нерівний горбистий рельєф. Актуальною проблемою регіону є водна ерозія ґрунтів [21].

Ґрунти області мають високу родючість. Ґрунтовий покрив області характерний для перехідної зони від південного лісостепу до північного степу.

Значні площі займають чорноземи з різним ступенем реградуровання та чорноземи опідзолені, темно-сірі опідзолені та сірі опідзолені ґрунти. Для південно-східних районів найпоширенішими ґрунтами є чорноземи звичайні, середньо- та малогумусні, а в південній частині – чорноземи звичайні малогумусні малопотужні [21].

Важливим фактором, що впливає на формування врожайності, є кліматичні ресурси. Зокрема, на прогнозування впливають показники загальних кліматичних умов, сума опадів щомісяця, активних та ефективних температур, дати настання перших та останніх заморозків, довжина вегетаційного періоду та гідротермічний коефіцієнт.

Клімат області рівномірно континентальний. Землею області з південного заходу на схід на півночі протікає смуга найвищого атмосферного тиску, на півночі від якої домінують мокруваті невагомні маси, власне що їх навівають західні вітри з Атлантичного океану, на півдні - континентальні повітряні маси. У другій половині літа на землі Кіровоградщини нерідко з'являється антициклон погоди з найвищими температурами повітря до + 38 °C і довгими посухами. Середньорічна жар повітря в області дає 7,7-8,4 °C тепла. Найбільш прохолодними були 1985 і 1987 років з середньорічною температурою повітря 5,6-6,4 °C, а найбільш теплими 1967, 1975 і 1989 років - 9,6 - 10,3 °C. Річна амплітуда хитання температури повітря домагається 70-75°C.

Найпрохолодніший місяць року - січень (середньомісячна температура повітря в середньому по області дає 5-6 °C холоду. Беззастережна найменша температура повітря відзначалася в 1935 році і давала 34-36 °C холоду. Тільки в літні місяці в повітрі не було температури нижче 0 °C. Найтепліший місяць року - липень, коли середньомісячна температура повітря досяга в середньому +20-21 °C. Беззастережний максимально температури повітря відзначався в 1909 і 1929 роках і складав +37-40 °C, а в Кропивницькому +38,7 °C.

Опади випадають найчастіше влітку і осінню у вигляді дощів. За теплий період (червень-жовтень) випадає в середньому 280-335 мм, за холодний(листопад-березень) - 125-140 мм В той же час в степовій зоні мають простір бездощові періоди тривалістю 30-40 днів [19].

Середньорічне чисельність опадів дає 499-582 мм Найбільше чисельність їх впливає в теплий етап року(близько 70%). Річне чисельність опадів на півночі 420-470 мм, на півдні - 400-430 мм Понад усе випадає опадів в липні 57-85 мм, а найменш всього у березні 27-34 мм.

Північно-західна доля і північна доля області лежить в мало зволоженій, але теплій агрокліматичній зоні, південна і східна - в посушливій і досить тепліше. Середньорічна умовна вологість повітря дає 73-76 %. Як правило сніговий покрив уточнюється в третій декаді листопада, а сходить в 2 декаді березня. Гранична висота снігового покрову у фон досягала 33-51 см Найбільше вимерзання землі досяга 98-144 см.

Дані за вегетаційний період 2020р. і 2021р. кількості опадів та температурного режиму повітря можна представити в вигляді Табл. 2.3

Таблиця 2.3

Дані кількості опадів та температурного режиму повітря в роки
проведення досліджень

Рік	Місяць						
	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
середньомісячна температура повітря, °C							
2020	9,2	13,2	21,8	23,1	23,0	20,0	14,9
2021	7,1	17,5	23,5	23,1	24,3	19,5	14,2
сума опадів, мм							
2020	8,7	85,1	58,2	25,1	5,2	29,1	17,5
2021	84,5	117,0	135,5	23,1	8,6	28,8	19,2

За погодними умовами квітень 2020 року був теплим. Опади випадали нерівномірно, загальна сума їх становила 8,7 мм. Травень був теплим, де середньомісячна температура повітря була вище – на 4,0°C. Літо було жарким. Середньомісячна температура повітря у червні-липні знаходилась в межах 21,8-23,1°C. Найбільша кількість опадів у вигляді злив відмічена у червні 58,2. У липні випало 25,1 мм.

В умовах 2021 року у квітні спостерігалась не дуже тепла погода із середньомісячною температурою 7,1°C, що на 2,1°C менше за дані 2020 року. Травень характеризувався збільшенням температури повітря, яка в середньому за місяць 2021 року давав 17,5°C, власне що на 4,3°C більше за показник 2020 року, а чисельність опадів давали 117,0 мм

Упродовж червня спостерігалися надмірна кількість опадів, коли випало 135,5 мм. Температурний режим осінньої вегетації за вересень і першу і другу декаду жовтня був зручний і забезпечував дієве становлення рослин пшениці озимої на початкових кроках.

Таким шляхом, погодні обставини за роки досліджень в цілому за етап осінньої і весняно- з червня по серпень вегетація і зимовий етап спокою пшениці озимими були змінними за дією на забезпечення врожайності зерна. Температурний режим осінньої вегетації за вересень і першу і другу декаду жовтня був зручний і забезпечував дієве становлення рослин пшениці озимої на початкових кроках.

Загалом агрометеорологічні умови для посівів озимих культур були задовільні.

На території області переважають північно-східні та північно-західні вітри, у травні різко збільшується кількість східних вітрів.

Клімату Кіровоградщини властиві і небезпечні явища погоди – такі, як сильні зливи, град, ожеледь, пилові бурі тощо. Нерідким явищем у степовій зоні є пилові або чорні бурі та суховії до 25-30 м/с, характерні для осінньо-

літнього періоду, які завдають великих збитків господарству зменшенням або повною загибеллю врожаю [21, 23].

Район проектування, по рослинності, відноситься до зони сільськогосподарських земель на місці лугових степів і остепнених луків.

Площа земель у Кіровоградській області складає 2458,8 тис. га, що становить 4,07 % від території України. У структурі сільськогосподарських угідь рілля становить 1764,6 тис. га, багаторічні насадження – 25,4 тис. га, пасовища та сіножаті – 242,2 тис. га. Розораність земель в області – 74,1 %, що на 17,3 % більше, ніж у середньому по Україні.

У північній частині області переважають чорноземи потужні малогумусні з вмістом гумусу 5 % і середньогумусні з вмістом гумусу дещо більше 5,5 %. Вагомих площ тут займають чорноземи в різному ступені реградовані, а ще чорноземи опідзолені, серыетемно - сіруваті опідзолені і рідше сірі опідзолені землі. Для південно-західних районів більше розповсюджено основами числяться чорноземи буденні, середньо- і малогумусні, а в південній частині - чорноземи звичайні неглибокі малогумусні і малопотужні. За механічним складом землі північних районів - важкосуглинкові, південних, - легкосуглинкові.

Нині система орного шару важливо зруйнована, це негативно відбивається на водно-фізичних властивостях, невагомому режиму, викликає ущільнення поверхневого шару, утворення кірки після дощів. По наданій основі знижується запас продуктивної вологи і водопроникність ґрунтів, яка призводить до активізації процесів ерозії.

Буквально усі збитки землі наносять аква і вітрова ерозії, неповоротні витрати гумусу і калорійних препаратів, засолення і закислення землі, висушування і перезволоження, в т. ч. заболочування, забруднення промисловими відходами і викидами, отрутохімікатами. Сенсі врожайності. Залежно від стану наукових знань і матеріально-технічної достовірності мають усі шанси бути намічені для нагороди різні сенсі врожайності : потенційна(ПУ),

яка відповідає найбільшій біо достовірності культури, її вигляду або ж ж гібриду, і приходу фотосинтетичний активній радіації(ФАР); справді можлива(ДМУ) більше надійна при тих, які мають простір бути метеорологічних і ґрунтових умовах; врожайність у виробництві(УВ), яка відповідає матеріально-технічній достовірності господарства.

Маючи дані по калорійності біомаси рослин і приходу ФАР, можна наближено визначити *потенційний урожай* за формулою:

$$ПУ = K_{\phi} \cdot K \cdot K_{\tau} \cdot \frac{\Sigma Q}{g \cdot 10^3},$$

де $ПУ$ – потенційний урожай у сухому стані, ц/га, при оптимальних метеорологічних і агротехнічних умовах; K_{ϕ} – коефіцієнт використання ФАР, виражений у частках одиниці (ККД ФАР 4% становить у частках одиниці 0,04); K_{τ} – коефіцієнт господарської ефективності врожаю, який показує частку корисної частини врожаю в загальній біомасі; ΣQ – кількість ФАР, що надходить за період вегетації, ккал/га або кДж/кг; g – калорійність біомаси рослин, ккал/кг або кДж/кг.

Наводимо дані, узагальнені І.Ф. Чарнавським і М.К. Коюмовим (1986), по калорійності окремих культур: озима пшениця – 4450 ккал/кг, або 18,631 кДж/кг.

Актинометричні станції фіксують надходження сонячної радіації у ккал/см² або кДж/см². Для переведення цього показника на площу 1 га його потрібно помножити на 10⁸. Частка ФАР становить 48-48,5% загальної кількості сонячної радіації.

У результаті розрахунку одержуємо дані про величину врожаю в сухому стані. Залишається до нього додати % стандартної для даного виду продукції вологи.

Дійсно можлива врожайність обмежується кількістю тепла, вологи, ґрунтовими та агротехнічними умовами, а також біологічними особливостями сортів і гібридів.

Рівень урожайності залежно від теплозабезпеченості може бути виражений запропонованим І. Д. Шашко біокліматичним показником:

$$БКП = \frac{\sum t > 10^{\circ}\text{C}}{1000}$$

Показники *БКП* 1,6-2,2 відповідають середній біологічній продуктивності рослин, обмежених ресурсами тепла.

При даному *БКП* продуктивність рослин залежить від наявності вологи і поживних речовин. В умовах зрошення ці фактори регулюються, що дає можливість з достатньою достовірністю встановлювати пряму залежність урожайності від *БКП*.

РОЗДІЛ 3. ВРОЖАЙНІСТЬ СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В ЦЕНТРАБНІЙ УКРАЇНІ

3.1.Методика проведення досліджень

Польові дослідження по вивченню врожайності сортів пшениці озимої проводили впродовж 2020 та 2021 років у товаристві з обмеженою відповідальністю “Агролан”. Схема досліду наведено у Таблиці 3.1.

Таблиця 3.1

Схема польового досліду

Номер варіанту	Попередник (Фактор А)	Сорт (Фактор В)
1	Стерня	Подільська
2		Фаворитка
3		Золотоколоса
4		Новокиївська
5		Кубус
6		Балетка
7		Скаген
8		Даринка Київська
9	Озимий ріпак	Подільська
10		Фаворитка
11		Золотоколоса
12		Новокиївська
13		Кубус
14		Балетка
15		Скаген
16		Даринка Київська
17	Соя	Подільська
18		Фаворитка
19		Золотоколоса
20		Новокиївська
21		Кубус
22		Балетка
23		Скаген
24		Даринка Київська

Висівали вісім сортів пшениці озимої після трьох попередників. Дослід двофакторний. Фактор А - попередники Фактор В – сорти. Облікова площа ділянки – 350 м². Повторність дослідів – дворазова.

Подолянка

Образ становлення - озимий. Середньостиглий, дозріває за 287 дня і ночі. Рослини середньої висоти заввишки 91-95 см, кущик прямостоячий. Колос білосніжного або ж солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середній щільності довжелезний із слабеньким восковим нальотом, наявні зубці. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини і крупитчаті, містить короткий язичок. Зимостійкість виду в критеріях проморожування вищесередня, в польових критеріях за роки перевірки зимостійкість виду давала 7 балів. Множина 1000 зерняток - 45,4 р. Віднесено до міцних пшениць. Борошномельні і хлібопекарські характеристики виду добрі і чудові. Сім'я має 14,0-14,7% білку, клейковини - 29,7-30,0%. Середня врожайність на Рівненському держекспертцентрі - 71,7 ц/га.

Фаворитка

Різновид лютеценс. Образ становлення озимий. Ствол середньої товщини, міцний, порожнистий. Колос білосніжний, циліндричний, напівостистий, завдовжки 10,5-11,5 см, середній щільності. Зернівка червона, велика, яйцеподібна. Висота рослин 88-94 см Зимостійкість виду в критеріях проморожування середня-вищесередня. Стійкість виду до полягає 9 балів. Стійкість до осипання 9 балів. Посухостійкість висока. Вид стійкий до головних захворювань зернових культур. Середній збір за останні 2 роки 55,9 ц/а. Множина 1000 зерняток 41,5 р. Середньостиглий, дозріває за 292-300 днів. Борошномельні і хлібопекарські характеристики виду добрі. Сім'я має 13,0-13,8% білку, 27,2-29,6% клейковини, загальна хлібопекарська оцінка - 8,2 балу. Дорога пшениця. Рекомендований для зон: Лісостеп, Полісся.

Золотоколоса

Висота рослин 86-96 см Зимостійкість виду в критеріях проморожування - середня- вищесередня, в польових критеріях за роки перевірки зимостійкість давала 7 балів. Вид містить вищу кущуватість, стійкість до вилягання 7,0-9,0 балу. Стійкість до осипання 8 балів. Стійкість до посухи 9,0 балів. За роки перевірки вид показав стійкість до борошнистої роси і бурої іржі. Середня врожайність за роки перевірки на Рівненському держекспертцентрі - 58,8 ц/а. Множина 1000 зерняток - 39,5 р. Вид посиленого на подібності. Середньостиглий, вегетаційний етап 285-300 дня і ночі. Борошномельні і хлібопекарські характеристики виду добрі. Сім'я має 13,3-13,8% білку, клейковини - 28,4-29,8%, загальна хлібопекарська оцінка - 7,7-8,0 балу. Дорога пшениця. Рекомендований для вигодовування в зонах: Степ, Лісостеп, Полісся.

Новокиївська

Образ становлення - озимий. Вид посиленого на подібності, кущик, середньостиглий, прямостоячий. Вегетаційний етап 290 днів. Рослини середні за висотою 94-98 см Множина 1000 зерн - 44,8 р. Зимостійкість виду в критеріях проморожування вищесередня, в польових критеріях за роки перевірки зимостійкість виду давала 8 балів. Колос білосніжного або ж солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої довжини і щільності, наявна остюку. Зернівка червоного кольору, середньої довжини і ширини, велика. Провідними захворюваннями і шкідниками вражається нижче стереотипів. Борошномельні і хлібопекарські характеристики властивості добродушні. Середня врожайність на Рівненському держекспертцентрі - 60,8 ц/а. Занесений до муніципального реєстру з 2010 року і рекомендовано для вигодовування в усіх ґрунтово-кліматичних зонах України.

Кубус

Середньорослий, висота рослин 76-82 см Середньостиглий, вегетаційний етап 290 днів. Стойка до полягає, осипання і посухи. Слабо вражається борошнистою росою і фузаріозом. Середня врожайність за роки перевірки на

Рівненському держекспертцентрі дає 68,1 ц/а. Множина 1000 зерняток 36,1г. Колос білосніжного або ж солом'яно-жовтого кольору, містить потужний восковий напад, циліндричної форми, середній за щільністю і завдовжки. Зернівка червоного кольору, середня за довжиною, шириною і крупністю. У польових критеріях за роки перевірки виду зимостійкість дає 9 балів. Початок колосіння середній. Вид відноситься до міцних пшениць. Борошномельні і хлібопекарські якості добродушні. Запропонований для вигодовування в зонах Лісостепу і Полісся.

Балетка

Образ становлення - озимий. Середньоранній, дозріває за 274 дні. Рослини середньої висоти заввишки 93 см, кущик прямостоячий. Колос білосніжного або ж солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності і довжини із слабеньким восковим нальотом, наявні ості. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини і крупності, містить середній язичок. Зимостійкість виду в критеріях проморожування вищесередня, в польових критеріях за роки перевірки зимостійкість виду давала 7 балів. Множина 1000 зерняток - 43,2 р. Віднесено до міцних пшениць. Борошномельні і хлібопекарські характеристики виду добрі і чудові. Сім'я має 13,0% білку, клейковини - 26,2%.

Скаген

Різновид лютесценс, безостий. Образ становлення - озимий. Вид нерідкого на подібності застосування, якісний, для вигодовування на добродушних агрофонах. Містить вищу зимостійкість на рівні стереотипів, в муніципальних сортовипробуваннях в усіх зонах отримував 8-9 балів. Кущик від напіврозлогого до розлогого. Колос білосніжного або ж солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, за щільністю - від середнього до непроникного, зернівка червоного кольору, велика. Середньостиглий, етап вегетації залежно від зони складав 275-285 днів. Середньорослий, висота рослин 75-85 см, стійкий до вилягання. Вид містить добру посухостійкість 9 балів.

Борошномельні і хлібопекарські характеристики виду задовільні. У критеріях муніципальних сортовипробувань зарекомендував чудову стійкість до головних листових захворювань, а ще захворюванням колосу і кореневої гнилизни. Рекомендований для вигодовування в зоні Лісостепу і Полісся, де зарекомендував чудові підсумки, важливо перевищивши сорти-стандарти.

Даринка Київська

Вид плавної м'якої озимої пшениці(різновид лютесценс), зареєстрований в Реєстрі видів України в 2016 році. Вид посиленого на подібності, відноситься до високоврожайних і міцних пшениць. Високорослий вид, висота рослин 101-105 см Середньоранній вид, вегетаційний етап 268-278 днів. Множина 1000 зерняток 42,7-49,4 р. Норма висіву насіння 5,5-6,0 млн. подібних насінин/а, залежно від зони вигодовування і вологозабезпечення. Гарантує отримання великих і розмірених урожаїв на великих фонах мінерального живлення. При активній технології вигодовування потребує внесення ретарданту. Вірогідна врожайність виду вище 100 ц/а. Середня врожайність в господарстві дає 89,8 ц/а. Вид характеризується найвищою зимостійкістю і посухостійкістю. Середньостійкий до вилягання, стійкий до осипання зерна в колосі. Містить досить найвище сприйняття до фузаріозу велетня, бурої листової іржі і борошнистої роси. Борошномельні і хлібопекарські характеристики виду відмінні: потужність борошна дає 267- 312 W об'єм хліба – 980–1000 мл. Зерно містить 13,2–14,0 % білка, 26,4–28,9 % клейковини.

Технологія вирощування пшениці після попередників.

Згодом збору попередників виготовлення землі під висівання озимої пшениці відбувалося відповідно до цього з радами. Під час виготовлення землі під сівбу озимини величезне значення містить своєчасність і черговість технологічних операцій, напружених на високоякісний обробіток і збір вологості. Згодом збору попередників неодмінно трапляється лушення або ж дискування стерні (залежно від попередньої культури) лушильниками або ж нелегкими дисковими боронами на глибину 8-10 см з цією метою

цілеспрямовано використовується групові агрегати з м'яких культиваторів, иглової борони і кільчасто-шпорових котків або ж їх аналоги (обробіток на глибину 10-12 см). Провідне доручення подібний передпосівної роботи - копітким чином вирівняти посівний шар землі для отримання раціонального розміщення насіння за глибиною, а перемішані з основою пожнивні останки, які роблять величезну його шпаруватість і призводять до важливих втрат вологості, - внести і прикоткувати.

Це зробить захисний мульчувальний ефект і забезпечить основу від посиленого нагрівання і втрат необхідної вологості. Далі розпушування землі проводять паровими культиваторами на глибину загортання насіння.

У технології вирощування озимих культур вагомий сенс має термін сівби, попередники і система добрива.

Рослини скоплюють достатню чисельність пластичних препаратів, завдяки яким вони краще ніж інші витримують погані обставини зимового періоду. У зв'язку з масовим потеплінням тривала тривалість осінньої вегетації, власне що скоректувало терміни сівби озимої пшениці: вони змістилися, відносно з середніми довголітніми показниками, на 10-15 днів. На початок зими в кращому фізіологічному стані, як правило, є присутніми рослини при висіві з 20 по 30 вересня, тобто в дозволено пізні терміни, які були рекомендовані раніше. Формування найвищої продуктивності озимих культур виходить добитися їх рівноважному живленню упродовж усього вегетаційного періоду, власне що призначене виразним дотриманням системи добрива. За осінній етап рослини озимої пшениці засвоюють до 30% калорійних препаратів спільної необхідності за вегетацію і негативно відгукуються на недостатнє багатство ними. Зайве чисельність в основі азотних сполук восени призводить до насиченого підйому, перерослі рослини міцно вражаються захворюваннями.

Система підживлення озимих культур згодом різних попередників враховує вступ в основу базисних складових живлення спільно з мінеральними добривами, які зобов'язані відшкодовувати їх винесення з урожаєм попередньої

культури. Беручи до уваги біо особливості озимих культур, вагому потребу в деталях живлення вони відчують в серйозніші фази становлення : під час кушіння, виходу в трубку, складання прапорцевого листка. Для необхідності озимої пшениці в азоті йде по стопах гарантувати послідовний його вступ належними частинами в напрям усієї вегетації(як методом біо фіксації з повітря згодом попередника, яким були бобові культури, наприклад і з мінеральних добрив). Для забезпечення високоякісного підйому і перезимівлі озимих культур необхідності у фосфорі доводяться на фази сходи - зупинки осінньої вегетації.

Обмежений вступ калію озимим рослинам в осінній етап не дотримується їх вуглеводний замін, який очевидно знижує міру стійкості до невисоких температур. У наслідок цього під час сівби восени під озимі культури потрібно заносити фосфорно-калійні добрива, а азотні - в помірному числі, яке забезпечить непогані обставини для перезимівлі і підвищить стійкість рослин навпроти захворювань. Використання добрив з врахуванням цих домагань станеться гарантувати добру продуктивність культур і підтримки родючості землі.

Необхідною подією у технології вигодовування озимої пшениці вважається протравлення насіння. Протравлюють кондиційне насіння, оброблене від домішок. Цю подію проводять за 5-10 днів до проведення висіву з підтримкою протруювачів[47].

У критеріях бракуючого зволоження для отримання актуальних сходів озимих культур вагоме сенс містить дотримання диференційованої глибини загортання насіння з урахуванням ваги 1000 насінин, термінів сівби, біо індивідуальностей виду і значення зволоження верхнього шару землі. При необхідної ґрунтової вологи висівають в підходящиеоптимальные терміни на глибину 5-6 см.

Висадження озимини згодом різних попередників становит їх в нерівнозначні обставини підйому і становлення. Це пов'язано, в першу чергу, з

різним чисельністю калорійних препаратів і вологості, власне що залишають попередники. Відмінності у вологозабезпеченні рослин озимої пшениці в етап осінньої вегетації визначені, в першу чергу, дією різних попередників. Як ведено, в критеріях степової зони провідне поповнення припасів вологості в основі в посівах озимої пшениці трапляється, у ведучому, упродовж осінньо-зимового періоду.

В процесі виконання польових дослідів провели обліки та спостереження.

Визначення густоти стояння рослин проводили таким чином. В кожному варіанті дослідів виділяли майданчики площею 1 м^2 і підраховували кількість рослин.

Облік кущистості рослин проводили за наступною методикою. Восени після припинення осінньої вегетації та весною через два тижні після відновлення весняної вегетації в кожному варіанті дослідів виділяли майданчики площею 1 м^2 . Всі рослини викопували і підраховували кількість стебел. Цей показник ділили на кількість рослин і таким чином визначали індивідуальну кущистість досліджуваних сортів.

Щільність стеблостою це розрахунковий показник. Його розраховували шляхом множення кількості рослин на 1 м^2 на показник індивідуальної кущистості рослин.

Збирання врожаю досліджуваних сортів пшениці озимої проводили за допомогою комбайна Джондір. Після збирання врожаю кожного варіанту дослідів зерно вивантажували в автомобіль і проводили зважування. Розраховували врожайність у центнерах на гектар.

3.2. Врожайність сортів пшениці озимої після різних попередників

Формування врожаю польових культур відбувається в результаті взаємодії внутрішніх фізіолого-біохімічних процесів, що протікають в клітинах рослин з умовами оточуючого середовища. Особливо великий вплив на

протікання фізіолого-біохімічних процесів мають температура оточуючого середовища, рівень вологозабезпечення рослин, світловий режим та інші фактори. Окремі із них мають позитивний вплив на формування врожаю, а інші навпаки – негативний.

У формуванні врожаю всіх польових культур особливо велике значення має густота стояння рослин. На відміні від інших польових культур, представники родини Злакових володіють здатністю до процесу кушіння. Це один із біологічних механізмів цих рослин, які дозволяють суттєво змінити щільність продуктивного стеблостою посівів пшениці озимої.

Відомо, що на процес осіннього кушення великий вплив мають погодні умови впродовж осіннього періоду. В наших дослідженнях це також підтвердилося.




Рис. 1. Показники кущистості рослин пшениці озимої у роки проведення досліджень, шт/рослину

Із вищенаведених даних чітко видно, що погодні умови осіннього періоду 2021 року були більш сприятливими для процесу кушіння рослин. Тому, кущистість рослин у середньому виявилася вищою ніж у 2020 році. У середньому кущистість рослин пшениці озимої у 2020 році склала 2,83 штук

стебел на одну рослину, а у 2021 році вона була більшою і становила 3.34 шт./рослину.

На куцистисть рослин пшениці озимої впливають дуже багато агротехнічних прийомів, що входять до складу технології її вирощування. Дослідженнями доведено, що строки сівби, норми висіву, попередники та інші прийоми можуть впливати на куцистисть рослин в осінній період.

Нашими дослідженнями також встановлено, що попередники впливають на куцистисть рослин пшениці озимої на час припинення осінньої вегетації (Рис.2).




Рис. 2. Вплив попередників на куцистисть рослин пшениці озимої, шт./рослину

Із вищенаведених даних видно, що в обидва роки досліджень нижчою куцистисть була при розміщенні сортів пшениці озимої після стерньового попередника. Так, у 2020 році куцистисть по цьому попереднику склала 2,38 шт./рослину тоді як після інших попередників куцистисть становила 3,54 та 2,63 шт./рослину.

Показники куцистості рослин досліджуваних сортів пшениці озимої у 2020 році наведено у таблиці 3.2.

Таблиця 3.2

Кущистість рослин досліджуваних сортів пшениці озимої після різних попередників, 2020 р.

Сорт	Попередник			Середнє
	стерньовий	Озимий ріпак	соя	
Подільянка	2,1	3,6	2,4	2,7
Фаворитка	2,2	3,4	2,3	2,6
Золотоколоса	2,9	3,6	2,5	3
Новокиївська	2,0	3,4	2,3	2,6
Кубус	2,6	3,7	2,9	3
Балетка	2,7	3,8	3,2	3,2
Скаген	2,5	3,9	3,3	3,2
Даринка Київська	2,0	2,9	2,1	2,3

Кущистість рослин після стреньового попередника змінювалася від 2,1шт./рослину і 2,0 сорту Новокиївська по 2,7шт./рослину сору Балетка. Із них найбільш високою кущистість була у сорт Золотоколоса 2,9 шт./рослину. Найменшою вона була у сорту Даринка Київська, а найбільшою у сорту Скаген. У решти сортів кущистість становила від 3,4шт./рослину до 3,6шт./рослину.

Після сої в 2020р. змінювалася від 2,1шт./рослину сорту Фаворитка по 2,9шт./рослину сорту Кубус. Найбільш висока – у сорту Скаген 3,3шт./рослину, найменшою – у сорту Дарина Київська 2,1шт./рослину. В середньому за роки досліджень 2020р., незалежно від попередників найбільша кущистість була у сорту 3,2шт./рослину Балетка та Скаген. В решти сортів кущистість була меншою.

Показники кущистості рослин досліджуваних сортів пшениці озимої у 2021 році наведено у таблиці 3.3.

Таблиця 3.3

Кущистість рослин пшениці озимої після різних попередників, 2021 р.

Сорт	Попередник			Середнє
	стерньовий	Озимий ріпак	соя	
Подільська	2,3	4,5	2,6	3,1
Фаворитка	2,5	4,1	2,6	3
Золотоколоса	2,6	4,1	2,8	3,1
Новокиївська	2,4	3,8	2,5	2,9
Кубус	2,8	4,6	3,0	3,5
Балетка	2,9	4,7	3,6	3,7
Скаген	2,9	4,2	3,8	3,6
Даринка Київська	2,5	3,3	3,1	3

Кущистість рослин після стерньового попередника в 2021р. змінювалася від 2,4шт./рослину сорту Новокиївська по 2,8шт./рослину сорту Кубус. Із них найбільш високою кущистість була у сорт Балетка 2,9 шт./рослину. Найменшою вона була у сорту Подільська, а найбільшою у сорту Скаген. У решти сортів кущистість становила від 4,1шт./рослину до 4,6шт./рослину.

Після сої в 2021р. змінювалася від 2,6шт./рослину сорту Фаворитка по 3,6шт./рослину сорту Балетка. Найбільш висока – у сорту Скаген 3,8шт./рослину, найменшою – у сорту Новокиївська 2,5шт./рослину. В середньому за роки досліджень 2021р., незалежно від попередників найбільша кущистість була у сорту 3,7шт./рослину Балетка. В решти сортів кущистість була меншою.

Густота посівів озимої пшениці є одним зі структурних елементів врожаю. Від неї залежить врожайність рослин. Густота посіву займає особливе місце, адже саме від неї залежать усі інші показники.




Рис. 3. Показники густоти рослин пшениці озимої у роки проведення досліджень, р/м²

Із вищенаведених даних чітко видно, що погодні умови осіннього періоду 2021 року були більш сприятливими для густоти рослин. Тому, густина рослин у середньому виявилася вищою ніж у 2020 році. У середньому густина рослин пшениці озимої у 2020 році склала 404,4 р/м², а у 2021 році вона була більшою і становила 404,9 р/м².

Дослідженнями також доведено, що важливий попередник, де при зменшеній густоті посіву озима пшениця під час кущіння утворюватиме додаткові пагони за рахунок підгону та недогону. За рахунок яких озима пшениця формує додатковий урожай. А при загущеному посіві, пшениця сама зменшить кількість рослин до оптимальної за рахунок внутрішньовидової конкуренції (Рис.4)




Рис. 4. Вплив попередників на густоту рослин пшениці озимої

Із вищенаведених даних видно, що в обидва роки досліджень нижчою густота була при розміщенні сортів пшениці озимої після стерньового попередника. Так, у 2020 році густота по цьому попереднику склала 389,5 р/м² тоді як після інших попередників густота становила 407,4 р/м² та 416 р/м².

Показники густоти рослин досліджуваних сортів пшениці озимої у 2020 році наведено у таблиці 3.4.

Таблиця 3.4.

Показники густоти рослин на час припинення осінньої вегетації після різних попередників, 2020 р.

Сорт	Попередник			Середнє
	стерньовий	Озимий ріпак	соя	
Подільянка	385	401	421	402
Фаворитка	384	411	411	402
Золотоколоса	395	409	417	407
Новокиївська	397	405	415	406
Кубус	389	407	414	403
Балетка	388	408	418	405
Скаген	391	412	417	407
Даринка Київська	387	406	415	403

Густота рослин після стреньового попередника змінювалася від 385 р/м² сорту Подільянка по 395 р/м² сорту Золотоколоса. Із них найбільш високою густота була у сорт Новокиївська 397 р/м² . Найменшою вона була у сорту Фаворитка, а найбільшою у сорту Скаген. У решти сортів кустистість становила від 401р/м² до 412 р/м².

Після сої в 2020р. змінювалася від 414р/м² сорту Кубус по 41418р/м² сорту балетка. Найбільш висока – у сорту Подільянка 421р./м², найменшою – у сорту Фаворитка 411р./м². В середньому за роки досліджень 2020р., незалежно від попередників найбільша густота була у сорту 407р./м² Золотоколоса та Скаген. В решти сортів густота була меншою.

Табл.3.5

Показники густоти рослин на час припинення осінньої вегетації після різних попередників, 2021 р.

Сорт	Попередник			Середнє
	стерньовий	Озимий ріпак	соя	
Подолянка	378	412	413	401
Фаворитка	375	426	416	406
Золотоколоса	395	414	404	404
Новокиївська	384	419	425	409
Кубус	371	421	417	403
Балетка	378	417	422	406
Скаген	379	419	409	402
Даринка Київська	394	414	417	408

Густота рослин після стреньового попередника в 2021р. змінювалася від 378р./м² сорту Подолянка та Балетка по 384р./м² сорту Новокиївська. Із них найбільш високою кущистість була у сорт Даринка Київська 394р./м². Найменшою вона була у сорту Кубус, а найбільшою у сорту Золотоколоса. У решти сортів густота становила 412р./м² до 426р./м².

Після сої в 2021р. змінювалася від 416р./м² сорту Фаворитка по 417р./м² сорту Даринка Київська. Найбільш висока – у сорту Новокиївська 425р./м², найменшою – у сорту Золотоколоса 404р./м². В середньому за роки досліджень 2021р., незалежно від попередників найбільша густота була у сорту 409р./м² Новокиївська. В решти сортів густота була меншою.

Відомо, що оптимальні параметри посівів на час припинення осінньої вегетації є 750–1200 стебел на 1м². Як надмірне загущення, так і зрідження стеблостою може вести до певних втрат. За сприятливих умов вологозабезпечення, на щільність посівів та час припинення осінньої вегетації впливають речі як : строки сівби, попередники, використання добрив, ріст регулюючих речовин. В наших дослідях це спостерігається.




Рис. 5. Показники щільності стеблостою рослин пшениці озимої у роки проведення досліджень, шт./м²

Із вищенаведених даних чітко видно, що погодні умови осіннього періоду 2021 року були більш сприятливими для щільності стеблостою рослин. Тому, щільності стеблостою рослин у середньому виявилася вищою ніж у 2020 році. У середньому щільності стеблостою рослин пшениці озимої у 2020 році склала 761.8шт./м², а у 2021 році вона була більшою і становила 767,8 шт./м².

Нашими дослідженнями також встановлено, що попередники впливають на щільності стеблостою рослин пшениці озимої на час припинення осінньої вегетації (Рис.6).




Рис. 6. Вплив попередників на щільність стеблостою рослин пшениці озимої, шт./м²

Із вищенаведених даних видно, що в обидва роки досліджень нижчою щільність стеблостою була при розміщенні сортів пшениці озимої після стерньового попередника. Так, у 2020 році щільність стеблостою по цьому попереднику склала 746,6шт./м² тоді як після інших попередників щільність стеблостою становила 762,9 та 776,6шт./м².

Показники щільності стеблостою рослин досліджуваних сортів пшениці озимої у 2020 році наведено у таблиці 3.6.

Таблиця 3.6

Показники щільності стеблостою посівів пшениці озимої на час припинення осінньої вегетації після різних попередників, шт/м² 2020 р.

Сорт	Попередник			Середнє
	стерньовий	Озимий ріпак	соя	
Подільська	745	768	775	762
Фаворитка	754	795	801	783
Золотоколоса	765	774	795	778
Новокиївська	751	761	784	765
Кубус	698	701	716	705
Балетка	691	712	722	708
Скаген	724	741	756	740
Даринка Київська	845	851	864	853

Щільність стеблостою рослин після стерньового попередника змінювалася від 698шт./м² сорту Кубус по 754шт./м² сорту Фаворитка. Із них найбільш високою щільність стеблостою була у сорт Золотоколоса 765шт./м². Найменшою вона була у сорту Балетка, а найбільшою у сорту Даринка Київська. У решти сортів щільність стеблостою становила 701шт./м² до 851шт./м².

Після сої в 2020р. змінювалася від 722шт./м² сорту Балетка по 784шт./м² сорту Новокиївська. Найбільш висока – у сорту Даринка Київська 864шт./м², найменшою – у сорту Кубус 716шт./м². В середньому за роки досліджень 2020р., незалежно від попередників найбільша щільність стеблостою була у

сорту 853шт./м² Даринка Київська. В решти сортів щільність стеблостою була меншою.

Показники щільності стеблостою рослин досліджуваних сортів пшениці озимої у 2021 році наведено у таблиці 3.7.

Таблиця 3.7

Показники щільності стеблостою посівів пшениці озимої на час припинення осінньої вегетації після різних попередників, шт/м² 2021 р.

Сорт	Попередник			Середнє
	стерньовий	Озимий ріпак	соя	
Подолянка	751	752	777	760
Фаворитка	762	781	837	793
Золотоколоса	767	779	797	781
Новокиївська	761	765	789	771
Кубус	695	714	728	712
Балетка	684	721	731	712
Скаген	712	756	757	741
Даринка Київська	851	862	905	872

Щільність стеблостою рослин після стреньового попередника змінювалася від 695шт./м² сорту Кубус по 762шт./м² сорту Фаворитка. Із них найбільш високою щільність стеблостою була у сорт Золотоколоса 767шт./м². Найменшою вона була у сорту Балетка, а найбільшою у сорту Даринка Київська. У решти сортів щільність стеблостою становила 714шт./м² до 862шт./м².

Після сої в 2021р. змінювалася від 731шт./м² сорту Балетка по 789шт./м² сорту Новокиївська. Найбільш висока – у сорту Даринка Київська 905шт./м², найменшою – у сорту Кубус 728шт./м². В середньому за роки досліджень 2021р., незалежно від попередників найбільша щільність стеблостою була у сорту 872шт./м² Даринка Київська. В решти сортів щільність стеблостою була меншою.

Морозостійкість як головний чинник зимостійкості виникає під час складної, але закономірної зміни певних етапів розвитку рослин. Потреба поступового проходження рослиною цілої низки фізіологічних процесів для появи в неї властивості морозостійкості виходить, що ця властивість проявляється закономірно, а не випадково. Вона визначається не тільки спадковою природою рослин, а й впливом конкретних зовнішніх умов. За браком потрібних зовнішніх чинників ця властивість може залишитися нерозвинутою. І це було досліджено.




Рис. 7. Показники зимостійкості рослин пшениці озимої у роки проведення досліджень, %

Із вищенаведених даних чітко видно, що погодні умови осіннього періоду 2021 року були більш сприятливими для зимостійкості рослин. Тому, зимостійкість рослин у середньому виявилася вищою ніж у 2020 році. У середньому зимостійкість рослин пшениці озимої у 2020 році склала 90,5%, а у 2021 році вона була більшою і становила 91,8%.

Нашими дослідженнями також встановлено, що попередники впливають на зимостійкість рослин пшениці озимої на час припинення осінньої вегетації (Рис.8).




Рис. 8. Вплив попередників на зимостійкість рослин пшениці озимої

Із вищенаведених даних видно, що в обидва роки досліджень нижчою зимостійкість була при розміщенні сортів пшениці озимої після стерньового попередника. Так, у 2020 році щільність стеблостою по цьому попереднику склала 89,1% тоді як після інших попередників щільність стеблостою становила 91,5 та 90,8%.

Показники зимостійкість рослин досліджуваних сортів пшениці озимої у 2020 році наведено у таблиці 3.7.

Таблиця 3.7

Зимостійкість сортів пшениці озимої після різних попередників, % 2020 р.

Сорт	Попередник			Середнє
	стерньовий	Озимий ріпак	соя	
Подільська	88,2	92,3	91,4	90,6
Фаворитка	90,4	91,4	93,5	91,8
Золотоколоса	92,4	94,5	93,1	93,3
Новокиївська	88,3	90,3	92,1	90,2
Кубус	86,2	89,4	88,3	88
Балетка	86,5	89,5	87,4	87,8
Скаген	89,5	91,2	90,5	90,4
Даринка Київська	91,2	93,5	90,4	91,7

Зимостійкість рослин після стреньового попередника змінювалася від 86,5% сорту Балетка по 88,3 % сорту Новокиївська. Із них найбільш високою зимостійкість була у сорт Скаген 89,5%. Найменшою вона була у сорту Кубус, а найбільшою у сорту Даринка Київська. У решти сортів зимостійкість становила 89,4% до 94,5%.

Після сої в 2020р. змінювалася від 88,3% сорту Кубус по 91,8% сорту Фавортка. Найбільш висока – у сорту Золотоколоса 93,5%, найменшою – у сорту Балетка 87,4%. В середньому за роки досліджень 2020р., незалежно від попередників найбільша зимостійкість була у сорту 93,3% Золотоколоса. В решти сортів зимостійкість була меншою.

Показники зимостійкості рослин досліджуваних сортів пшениці озимої у 2021 році наведено у таблиці 3.8.

Таблиця 3.8

Зимостійкість сортів пшениці озимої після різних попередників, % 2021 р.

Сорт	Попередник			Середнє
	стерньовий	Озимий ріпак	соя	
Подільська	90,3	94,5	93,2	92,7
Фаворитка	92,1	92,8	95,4	93,4
Золотоколоса	93,6	96,3	93,4	94,4
Новокиївська	86,2	94,2	96,2	92,2
Кубус	89,4	91,5	90,3	90,4
Балетка	88,3	91,3	88,3	89,3
Скаген	90,4	90,7	89,4	90,2
Даринка Київська	89,4	92,4	94,5	92,1

Зимостійкість рослин після стреньового попередника змінювалася від 88,3% сорту Балетка по 90,4% сорту Скаген. Із них найбільш високою зимостійкістю була у сорт Фаворитка 92,1%. Найменшою вона була у сорту Новокиївська, а найбільшою у сорту Золотоколоса. У решти сортів зимостійкість становила 91,3% до 96,3%.

Після сої в 2021р. змінювалася від 89,4% сорту Скаген по 94,5% сорту Даринка Київська. Найбільш висока – у сорту Новокиївська 96,2%, найменшою – у сорту Балетка 88,3%. В середньому за роки досліджень 2021р., незалежно від попередників найбільша зимостійкість була у сорту 94,4% Золотоколоса. В решти сортів зимостійкість була меншою.

Ріст стебла озимої пшениці починається з нижнього міжвузля, яке видовжується, піднімаючи догори у листовій трубці друге і наступні міжвузля. Початком фази трубкування вважається той період, коли стебловий вузол першого міжвузля піднімається на висоту 2 — 3 см від поверхні ґрунту. Вцей період спостерігається інтенсивний ріст вегетативної маси, формування та диференціація суцвіть, репродуктивних органів, їх інтенсивний ріст. У цей період рослини дуже вибагливі до поживних речовин та вологи, так як і до попередників. Це розглянемо далі.




Рис. 9. Показники кущистості рослин пшениці озимої на початку фази трубкування у роки проведення досліджень, шт./рослину

Із вищенаведених даних чітко видно, що погодні умови осіннього періоду 2020 року були більш сприятливими для кущистості на початку фази трубкування рослин. Тому, кущистості на початку фази трубкування рослин у середньому виявилася вищою ніж у 2021 році. У середньому кущистості на початку фази трубкування рослин пшениці озимої у 2020 році склала 2,9шт./рослину, а у 2021 році вона була меншою і становила 2,8шт./рослину.

Нашими дослідженнями також встановлено, що попередники впливають на куцистість на початку фази трубкування рослин пшениці озимої на час припинення осінньої вегетації (Рис.10).




Рис. 10. Вплив попередників на куцистість на початку фази трубкування рослин пшениці озимої

Із вищенаведених даних видно, що в обидва роки досліджень нижчою куцистістю на початку фази трубкування була при розміщенні сортів пшениці озимої після стерньового попередника. Так, у 2020 році куцистість на початку фази трубкування по цьому попереднику склала 2,6шт./рослину, тоді як після інших попередників щільність стеблостою становила 3,3шт./рослину та 2,7шт./рослину.

Показники куцистістості на початку фази трубкування рослин досліджуваних сортів пшениці озимої у 2020 році наведено у таблиці 3.9.

Таблиця 3.9

Кущистість рослин пшениці озимої після різних попередників на початку фази трубкування, шт./рослину 2020 р.

Сорт	Попередник			Середнє
	стерньовий	Озимий ріпак	соя	
Подолянка	2,3	3,3	2,6	2,7
Фаворитка	2,4	3,1	2,4	2,6
Золотоколоса	3,0	3,6	2,7	3,1
Новокиївська	2,3	3,3	2,4	2,7
Кубус	2,8	3,5	3,1	3,1
Балетка	2,9	3,4	3,1	3,1
Скаген	2,7	3,6	3,2	3,2
Даринка Київська	2,3	2,7	2,4	2,5

Кущистість на початку фази трубкування рослин після стреньового попередника змінювалася від 2,4шт./рослину сорту Фаворитка по 2,8шт./рослину сорту Кубус. Із них найбільш високою кущистість на початку фази трубкування була у 2,7шт./рослину сорт Скаген. Найменшою вона була у сорту Подолянка, Новокиївська та Даринка Київська, а найбільшою у сорту Золотоколоса. У решти сортів кущистість на початку фази трубкування становила 2,7шт./рослину до 3,6шт./рослину.

Після сої в 2020р. змінювалася від 2,6шт./рослину сорту Подолянка по 3,1шт./рослину сорту Балетка. Найбільш висока – у сорту Скаген 3,2шт./рослину, найменшою – у сорту Фаворитка 2,4шт./рослину В середньому за роки досліджень 2020р., незалежно від попередників найбільша кущистість на початку фази трубкування була у сорту 3,2 Скаген. В решти сортів кущистість на початку фази трубкування була меншою.

Показники кущистості на початку фази трубкування рослин досліджуваних сортів пшениці озимої у 2021 році наведено у таблиці 3.10.

Таблиця 3.10

Кущистість рослин пшениці озимої на початку фази трубкування після різних попередників, 2021 р.

Сорт	Попередник			Середнє
	стерньовий	Озимий ріпак	соя	
Подільська	2,2	3,3	2,1	2,5
Фаворитка	2,1	3,5	2,5	2,7
Золотоколоса	2,5	3,4	2,4	2,8
Новокиївська	2,3	3,5	2,3	2,7
Кубус	2,6	3,6	2,6	2,9
Балетка	2,5	3,2	2,7	2,8
Скаген	2,7	3,5	2,6	2,9
Даринка Київська	2,6	3,2	2,5	2,8

Кущистості на початку фази трубкування рослин після стреньового попередника змінювалася від 2,5шт./рослину сорту Золотоколоса по 2,6шт./рослину сорту Кубус. Із них найбільш високою кущистості на початку фази трубкування була у сорт Даринка Київська 2,6шт./рослину. Найменшою вона була у сорту Фаворитка, а найбільшою у сорту Скаген. У решти сортів кущистості на початку фази трубкування становила 3,2шт./рослину до 3,6шт./рослину.

Після сої в 2021р. змінювалася від 2,4шт./рослину сорту Золотоколоса по 2,5шт./рослину сорту Подільська. Найбільш висока – у сорту Балетка 2,7шт./рослину, найменшою – у сорту Подільська 2,1шт./рослину. В середньому за роки досліджень 2021р., незалежно від попередників найбільша кущистість на початку фази трубкування була у сорту 2,9шт./рослину Кубус та Скаген . В решти сортів кущистість на початку фази трубкування була меншою.

Озима пшениця, навіть достатньо забезпечена поживними речовинами і дотримання агротехнічних вимог її вирощування, дуже вибаглива до попередників. Агротехнічне значення останніх визначається залишковими запасами вологи. Запаси вологи в ґрунті визначають своєчасність з'явлення

сходів, розвиток рослин, що й впливає головним чином на рівень майбутнього урожаю. Це видно в наших дослідях.




Рис.11. Показники урожайності рослин пшениці озимої у роки проведення досліджень, ц/га

Із вищенаведених даних чітко видно, що погодні умови осіннього періоду 2021 року були більш сприятливими для урожайності рослин. Тому, урожайність рослин у середньому виявилася вищою ніж у 2020 році. У середньому урожайність рослин пшениці озимої у 2020 році склала 32,3ц/га, а у 2021 році вона була більшою і становила 55,5ц/га.

Нашими дослідженнями також встановлено, що попередники впливають на урожайність рослин пшениці озимої на час припинення осінньої вегетації (Рис.12).




Рис. 12. Вплив попередників на урожайність рослин пшениці озимої

Із вищенаведених даних видно, що в обидва роки досліджень нижчою урожайність була при розміщенні сортів пшениці озимої після стерньового попередника. Так, у 2020 році урожайність по цьому попереднику склала 30,4ц/га, тоді як після інших попередників урожайність становила 34,3ц/га та 32ц/га.

Показники урожайності рослин досліджуваних сортів пшениці озимої у 2020 році наведено у таблиці 3.11.

Таблиця 3.11

Урожайність сортів пшениці озимої після різних попередників,ц/га 2020 р.

Сорт	Попередник			Середнє
	стерньовий	Озимий ріпак	соя	
Подільянка	27,5	33,2	30,2	30,3
Фаворитка	31,2	35,6	32,1	33
Золотоколоса	32,3	36,4	34,2	34,3
Новокиївська	36,4	36,2	35,1	35,9
Кубус	26,5	32,1	27,4	28,7
Балетка	25,9	31,4	28,4	28,6
Скаген	26,2	30,3	29,3	28,6
Даринка Київська	37,4	39,4	39,1	38,6

Урожайність рослин після стреньового попередника змінювалася від 26,5ц/га сорту кубус по 32,3 сорту Золотоколоса. Із них найбільш високою урожайність була у 36,4ц/га сорт Новокиївська. Найменшою вона була у сорту Скаген, а найбільшою у сорту Даринка Київська. У решти сортів зимостійкість становила 30,3ц/га до 39,4ц/га.

Після сої в 2020р. змінювалася від 29,3 сорту Скаген по 34,2ц/га сорту Золотоколоса. Найбільш висока – у сорту Даринка Київська 39,1ц/га, найменшою – у сорту Кубус 27,4ц/га. В середньому за роки досліджень 2020р., незалежно від попередників найбільша урожайність була у сорту 35,9ц/га Новокиївська. В решти сортів урожайність була меншою.

Показники урожайності рослин досліджуваних сортів пшениці озимої у 2021 році наведено у таблиці 3.12.

Таблиця 3.12

Урожайність сортів пшениці озимої після різних попередників, ц/га 2021 р.

Сорт	Попередник			Середнє
	стерньовий	Озимий ріпак	соя	
Подільянка	42,4	63,2	52,1	52,6
Фаворитка	46,2	61,3	53,6	53,7
Золотоколоса	43,6	59,6	59,8	54,3
Новокиївська	41,5	65,3	57,3	54,7
Кубус	48,5	69,4	58,3	58,7
Балетка	49,3	71,2	56,2	58,9
Скаген	46,3	71,4	54,2	57,3
Даринка Київська	43,6	66,4	50,3	53,4

Урожайність рослин після стреньового попередника змінювалася від 42,4ц/г сорту Подільянка по 46,3ц/га сорту Скаген. Із них найбільш високою урожайність була у сорт Кубус 48,4ц/га. Найменшою вона була у сорту Новокиївська, а найбільшою у сорту Балетка. У решти сортів урожайність становила 59,6 ц/га до 71,4 ц/га.

Після сої в 2021р. змінювалася від 53,6ц/га сорту Фаворитка по 56,2ц/га сорту Балетка. Найбільш висока – у сорту Золотоколоса 59,8ц/га, найменшою – у сорту Даринка Київська 50,3ц/га. В середньому за роки досліджень 2021р., незалежно від попередників найбільша урожайність була у сорту 58,9ц/га Балетка . В решти сортів урожайність була меншою.

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ РІЗНИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ

Ефективність встановлюється відношенням результату (ефекту) до витрат, що забезпечили його отримання. Показує характер причинно-наслідкових зв'язків виробництва. Вона вказує не сам результат, а якою ціною він був досягнутий.

Економічна ефективність – це найбільша вигода, яку можна побачити при найменших затратах в процесі економічної діяльності дивлячись на додаткові умови, які мають місце в момент визначення ефективності відповідного господарського заходу.

Діяльність зернового господарства здійснює великий вплив на рівень розвитку інших галузей економіки і соціальної сфери та визначає продовольчу стабільність регіону й держави в цілому. Низький рівень ефективності, зерновиробництва створює перешкоди на шляху повноцінного внутрішнього ринку зерна та продуктів його переробки. Дослідження поточної ситуації, що склалася в зерновій галузі, дає змогу зрозуміти, що на сьогодні потребує вирішення проблема забезпечення виробництва продовольчого зерна пшениці високої якості, збільшення його прибутковості.

Робота зернового господарства утілює в життя величезну дію на міру становлення інших секторів економіки економіки і громадської сфери і визначає продовольчу міцність ареалу і країни в цілому. Дивлячись на те, власне чого ми час від часу живемо в періоди не тільки фінансового, але і енергетичного занепаду, фінансова ефективність при вирощуванні сільськогосподарської продукції вважається важливим моментом. Розрахунки характеристик фінансової продуктивності вигодовування різних видів озимої пшениці за системи вивчаємих моментів проводили на базі розрахованих та складених технологічних карт (Додаток А) вирощування з урахуванням сучасних цін на матеріальні ресурси.

А економічну ефективність саме пшениці озимої різних сортів після попередника стерньовий розглянемо нижче (Табл.4.1.).

Таблиця 4.1

Економічна ефективність вирощування різних сортів пшениці озимої
після попередника стерньовий

Показники	Сорт							
	Подільська	Фаворитка	Золотоколося	Новокиївська	Кубус	Балетка	Скаген	Даринка Київська
Урожайність, ц/га	35,0	38,7	38,0	39,0	37,5	37,6	36,3	40,5
Вартість продукції, грн./т	6900	6900	6900	6900	6900	6900	6900	6900
Виручка від реалізації отриманої продукції, грн./га	241500	267030	262200	269100	258750	259440	250470	279450
Сума виробничих витрат на вирощування продукції, грн./га	12526	12615	12598	12623	12586	12589	12557	12659
Умовно чистий дохід, грн./га	11624	14088	13622	14287	13289	13355	12490	15286
Собівартість 1 зерна, грн	3579	3260	3315	3237	3356	3348	3459	3126
Розрахунковий рівень рентабельності, %	92,8	111,7	108,1	113,2	105,6	106,1	99,5	120,8

Як показали одержані результати, серед досліджуваних сортів найвищі економічні показники має сорт Даринка Київська. Середня урожайність за два роки становить 40,5ц/га. Виручка від реалізації - 279450.00грн.; сумовані

витрати становлять 12659,00грн.; чистий дохід – 15286,00грн.; собівартість станове 3126,00грн. і найвищий рівень рентабельності -120,8%.

Далі розглянемо економічну ефективність пшениці озимої різних сортів після попередника Озимий ріпак (Табл.4.2.).

Таблиця 4.2

Економічна ефективність вирощування різних сортів пшениці озимої
після попередника Озимий ріпак

Показники	Сорт							
	Подільнка	Фаворитка	Золотоколося	Новокиївська	Кубус	Балетка	Скаген	Даринка
Урожайність, ц/га	48,2	48,5	48,0	50,8	50,8	51,3	50,9	52,9
Вартість продукції, грн../т	6900	6900	6900	6900	6900	6900	6900	6900
Виручка від реалізації отриманої продукції, грн../га	332580	334650	331200	350520	350520	353970	351210	365010
Сума виробничих витрат на вирощування продукції, грн../га	12844	12852	12840	12907	12907	12919	12909	12958
Умовно чистий дохід, грн../га	20414	20613	20280	22145	22145	22478	22212	23543
Собівартість 1 зерна, грн	2665	2650	2675	2541	2541	2518	2536	2449
Розрахунковий рівень рентабельності, %	158,9	160,4	158,0	171,6	171,6	174,0	172,1	181,7

Як показали одержані результати, серед досліджуваних сортів найвищі економічні показники має також сорт Даринка Київська. Середня урожайність за два роки становить 52,9ц/га. Виручка від реалізації – 365010.00грн.; сумовані витрати становлять 12958,00грн.; чистий дохід – 23543,00грн.; собівартість станове 2449,00грн. та найвищий рівень рентабельності -181,7%.

Далі розглянемо економічну ефективність пшениці озимої різних сортів після попередника соя (Табл.4.3.).

Таблиця 4.3

Економічна ефективність вирощування різних сортів пшениці озимої
після попередника соя

Показники	Сорт							
	Подільська	Фаворитка	Золотоколоса	Новокиївська	Кубус	Балетка	Скаген	Даринка Київська
Урожайність, ц/га	41,2	42,9	47,0	46,2	42,9	42,3	41,8	44,7
Вартість продукції, грн./т	6900	6900	6900	6900	6900	6900	6900	6900
Виручка від реалізації отриманої продукції, грн./га	284280	296010	324300	318780	296010	291870	288420	308430
Сума виробничих витрат на вирощування продукції, грн./га	12526	12717	12815	12796	12717	12702	12690	12760
Умовно чистий дохід, грн./га	11624	16884	19615	19082	16884	16485	16152	18083
Собівартість 1 зерна, грн	3579	2964	2727	2770	2964	3003	3036	2855
Розрахунковий рівень рентабельності, %	92,8	132,8	153,1	149,1	132,8	129,8	127,3	141,7

Як показали одержані результати, серед досліджуваних сортів найвищі економічні показники має сорт Золотоколоса. Середня урожайність за два роки становить 47,0ц/га. Виручка від реалізації – 324300.00грн.; сумовані витрати становлять 12815,00грн.; чистий дохід – 19615,00грн.; собівартість станове 2727.00грн. та найвищий рівень рентабельності -153.1%.

Отже, вищенаведений аналіз дозволяє нам стверджувати, що при розміщенні пшениці озимої після озимого ріпаку та стерньового попередника більш доцільно використовувати сорт Даринка Київська. Умовно чистий дохід відповідно становить 23543 та 15286 грн./га, а розрахунковий рівень рентабельності відповідно 181,7 та 120,8%. Після сої на дерно доцільніше вирощувати сорт Золотоколоса. Його вирощування забезпечує отримання умовно чистого доходу на рівні 19615 грн/га, а розрахунковий рівень рентабельності становить 19615 грн./га.

РОЗДІЛ 5. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ДОВКІЛЛЯ

Охорона праці – порядок правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, направлених на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі роботи. Жодна галузь суспільного виробництва не зв'язана так з природними ресурсами, як сільське господарство, зокрема, агрономія, яке необхідно розглядати як величезний, постійно діючий механізм охорони, культивування природних багатств. Підходити до нього треба ще під одним кутом зору – охорони навколишнього середовища(довкілля). Тому в аграрному виробництві використання природних ресурсів і, перш за все, землі, повинно поєднуватися з заходами щодо охорони навколишнього середовища та забезпечення екобезпеки.

Основним із охорони праці в сільському господарстві є влаштування для працівників здорових, безпечних умов праці, попередження та профілактика виникнення нещасних випадків та травматичних ситуацій, тобто захист працюючих від впливу шкідливих факторів - хімічних, фізичних, біологічних та психофізичних. Сільськогосподарське виробництво, зокрема, агрономія, характеризується низкою структурних, організаційних, технологічних речей, що впливають на рівень небезпечних ситуацій та роблять цю галузь однією з найбільш травмонебезпечних. Широке впровадження інтенсивних технологій, високоефективної механізації праці, зростання рівня хімізації, що супроводжується появою додаткових небезпечних та шкідливих виробничих факторів, негативно впливають на здоров'я й безпеку аграріїв.

5.1. Організація та функція служби охорони праці на СГП

Законом України «Про охорону праці» визначено чітку систему органів державного управління і нагляду за охороною праці (ОП), що забезпечує виконання державою належної ролі у вирішенні завдань ОП. Загальне

управління ОП здійснюється на чотирьох рівнях: державному, регіональному, галузевому та на підприємстві.

Система ОП в аграрній галузі виробництва закріплена в ряді нормативно-правових актів України. Зокрема, основні положення сформульовані у Законі України «Про охорону праці» від 2002 р. та в ряді Законів України.

Для рослинництва властивими вважаються різні роботи, пов'язані з приміненням пестицидів і мінеральних добрив, : боротьба з бур'янами, шкідниками і захворюваннями рослин, виготовлення сумішей трудящих, протрави насіння, опилування, обприскування, фумігація рослин, землі і приміщень, виготовлення і розкидання протравлених приманок, підживлення рослин, внесення мінеральних добрив. Майже усі пестициди і мінеральних добрив вважається отруйними для людського організму, здатними викликати недотримання звичайної життєдіяльності і грати в якості передумови гострих або ж придбаних інтоксикацій. Піднесений міру загрози мають і механізовані роботи в аграрництві, тому що співробітники піддаються довготривалій дії збільшеного значення шуму, пульсації, збільшеної температури в кабіні тракторів і комбайнів, знервованим перенапруженням, яке призводить до найвищих показників виробничого травматизму. Весняно-польові роботи – напружений етап річного циклу агропромислового виробництва.

5.2. Техніка безпеки при виконанні посівних механізованих робіт

З початком проведення польових робіт в агропромисловому комплексі значно зростають обсяги та інтенсивність виконання технологічних операцій, зв'язаних із посівною компанією. Зростає кількість осіб, що беруть участь у виробництві, кількість задіяної техніки, тривалість сільськогосподарських робіт протягом доби тощо. Керівникам і спеціалістам підприємств слід обов'язково проводити постійну профілактичну роботу по запобіганню виробничого травматизму в поточному році, та організовувати роботу та техніку безпеки на підприємстві згідно «Правил охорони праці у

сільськогосподарському виробництві» (НПАОП 01.0-1.02-18), особливо під час посівної.

Вимоги з техніки безпеки при цьому висуваються: до техніки загалом (підготовчі операції, техніка безпеки), самохідних машин (тракторів та їх експлуатаційних норм), причіпних і навісних сільськогосподарських машин (належний стан технічної документації); до поля та маршруту (підготовка поля і визначення маршруту відповідно до розроблених та певним чином затверджених правил); до персоналу та робочих місць (проведення інструктажу з ОП та пожежної безпеки, організація належних умов праці, створення пунктів обігріву, харчування, медичної допомоги); роботі в полі (загальна перевірка до і під час проведення польових робіт).

При проведенні польових справ категорично забороняється: впровадження машин, облаштувань оснащення і інструменту в неробочому стані і не за призначенням; знищення поломці техніки на працюючому устаткуванні без його зупинки; робота без захисних приладів, спецодягу і засобів персонального захисту; проїзд сільгоспмашинами за незапланованими маршрутами та ін. Тому що головною ланкою забезпечення земельних справ вважається людина, а з нею щільно пов'язано поняття "Людського чинника", забороняється: допуск співробітників до виконання справ без проходження важливого інструктажу з ОП, в стані сп'яніння або ж наркотичного сп'яніння, в хворому стані та ін. [36].

Потрібно помітити, власне що ведення прогресивною посівною не можна без застосування пестицидів і мінеральних добрив. При даному слідє триматися належних правил з техніки захищеності :

-транспортування, збереження і використання пестицидів потрібно утілити в життя з дотриманням вимог Закону України "Про пестициди і агрохімікати" і інших нормативно-правових актів в частині безпечного втілення справ з транспортування, збереження і їх застосування;

- утілити роботи в темний час дня і ночі, пов'язані з перевезенням аміаковмісних мінеральних добрив, виготовленням сумішей, змішуванням їх і внесенням в основу не дозволяється;

- не перевозити в один і той час різні пестициди, хім взаємодія яких у разі порушення щільності упаковки має можливість спричинити займання;

- не дозволяється транспортувати пестициди і протравлені семечкисемена спільно з біо способами оборони рослин, харчовими і кормовими продуктами і іншими вантажами, а ще з людьми;

- забороняється застосувати для збереження товарів, фуражу, води і що аналогічне тару від мінеральних добрив, у тому числі і згодом її знешкодження(знезараження) [33].

Під час обробки землі, сівби, саджання і нагляду за посівами треба:

- роботи, пов'язані з підготовкою мінеральних добрив до внесення в основу, утілити в життя з підтримкою пристроїв, обладнаних приладами для пониження пилоутворення;

- не дозволяється змішувати суміші пестицидів саме у фон без засобів механізації;

- співробітникам не дозволяється перебувати в зоні вірогідного переміщення маркерів або ж підвісних машин під час розгортання машинно-тракторних агрегатів;

- під час переміщення агрегату не допускається одночасний сервіс одним працівником 2-ух або ж більше за сівалки;

- завантаження сівалок і посівних машин насінням, посівним матеріалом і добривами зобов'язаний бути механізованим. Ручне завантаження дозволяється тільки за умови зупинки посівного або ж посівного агрегату і виключення мотора трактора;

- співробітникам забороняється зходити на або ж сідати з машин під час їх переміщення і таке все ін. [30].

Усі працюючі на токах повинні мати засоби індивідуального захисту залежно від виду виконуваної роботи та дотримуватись техніки безпеки на об'єктах робочих процесів.

Виконання таких простих правил; належним чином ознайомлення з технікою безпеки, яка проводиться під час інструктажів; дотримання чітких інструкцій зменшує в рази травматизм на робочому місці.

5.3. Охорона довкілля при виконанні запропонованих робіт, агрозаходів

На даний момент актуальність проблеми охорони навколишнього середовища в сільському господарстві посилюється в сучасних умовах у зв'язку з процесами забруднення ресурсів природи, що використовуються в аграрному господарстві. Забруднення ведуть до зниження родючості ґрунтів і продуктивності, погіршення якості вод, атмосфери, наносять шкоди рослинництву, що є причиною погіршення якості продукції.

Охорона довкілля це система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, та збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки [37]. Це й сукупність державних, адміністративних, правових, економічних, політичних і суспільних заходів, спрямованих на раціональне використання, відтворення і збереження ресурсів землі, обмеження негативного людського впливу на довкілля.

Нинішній екологічний стан України характеризується «переспоживанням» ресурсів природи. Так, в Україні на одиницю ВВП витрачається майже тонна природних ресурсів. [34]. Сільськогосподарське виробництво впливає на стан інших екологічних компонентів навколишнього природного середовища – воду та атмосферне повітря. Внесені мінеральні добрива, а також засоби захисту рослин від шкідників і хвороб сільськогосподарських рослин частково вимиваються та потрапляють до водних об'єктів. В Україні діє низка законодавчих актів, в яких передбачено механізми стимулювання підприємств до раціонального, екологічно безпечного використання які є у виробництві

ресурсів, у т.ч. у сфері сільського господарства. Це, насамперед, Земельний, Водний та Повітряний кодекси України, Закони України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону земель», «Про охорону атмосферного повітря» та ін. Тому Україні слід використовувати світовий досвід ведення економічної діяльності з урахуванням екологічних вимог збереження довкілля еколого-спрямованого сільськогосподарського виробництва, задіяних у світовій практиці.

Є порядок доступності й відкритості інформації з питань охорони праці. У Законі передбачені механізми попередження шкоди людині й суспільству, а також відшкодування завданого збитку, закладені правові норми, котрі забезпечують організаційно-господарську та наглядову діяльність шляхом визначення повноважень, прав і відповідальності господарських органів, а також органів місцевого самоврядування і виконавчих органів влади. Закон передбачає чітку систему державного управління охороною праці від уряду, при якому створена Національна рада з гарантування безпечної діяльності населення, до підприємства.

Зараз у сільськогосподарському виробництві постійно зростає кількість технологічних процесів, різноманітних речовин, генетично-модифікованих організмів, що становлять небезпеку для життя та здоров'я працівників сільського господарства. Дивлячись на ці нові небезпечні та шкідливі чинники з метою розробки ефективних заходів та з охорони праці та їх закріплення на законодавчому рівні є підґрунтям для підвищення рівня безпеки сільського господарства.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ

В результаті проведених досліджень встановлено, що досліджувані сорти володіють різними морфо-біологічними властивостями, що в кінцевому результаті відображається у біометричних показниках рослин та їх посівів на час припинення осінньої вегетації та формуванні врожаю.

1. Кущистість рослин досліджуваних сортів пшениці озимої на час припинення осінньої вегетації залежала від погодних умов, попередників та генетичних особливостей рослин. У 2020 році кущистість рослин була меншою і склала 2,83 штук стебел на рослину проти 3,34 шт./рослину в умовах 2021 року. Розміщення пшениці після озимого ріпаку забезпечувало більш високу кущистість рослин пшениці озимої на час припинення осінньої вегетації порівняно з попередниками соя та соняшник. Більш високу кущистість мають рослини сортів Балетка та Скаген. В умовах 2020 року кущистість рослин цих сортів відповідно становила 3,2 та 3,2 шт./рослину, а у 2021 році 3,7 та 3,6 шт./рослину.
2. Густота рослин досліджуваних сортів пшениці озимої на час припинення осінньої вегетації залежала від погодних умов, попередників та генетичних особливостей рослин. У 2020 році густота рослин була меншою і склала 404,4р./м² проти 404,9р./м² в умовах 2021 року. Розміщення пшениці після озимого ріпаку забезпечувало більш високу густоту рослин пшениці озимої на час припинення осінньої вегетації порівняно з попередниками соя та соняшник. Більш високу густоту мають рослини сортів Скаген та Золотоколоса. В умовах 2020 року густота рослин цих сортів відповідно становила 407 та 407р./м², а у 2021 році рослини сортів Новокиївська та Даринка Київська 409 та 408р./м².
3. Щільність стеблостою рослин досліджуваних сортів пшениці озимої на час припинення осінньої вегетації залежала від погодних умов,

попередників та генетичних особливостей рослин. У 2020 році щільність стеблостою рослин була меншою і склала 761,8 шт./м² проти 767,8 шт./м² в умовах 2021 року. Розміщення пшениці після сої забезпечувало більш високу щільність стеблостою рослин пшениці озимої на час припинення осінньої вегетації порівняно з попередниками Озимий ріпак та соняшник. Більш високу щільність стеблостою мають рослини сортів Даринка Київська та Фаворитка. В умовах 2020 року щільність стеблостою рослин цих сортів відповідно становила 853 та 783 шт./м², а у 2021 році 872 та 793 шт./рослину.

4. Зимостійкість рослин досліджуваних сортів пшениці озимої на час припинення осінньої вегетації залежала від погодних умов, попередників та генетичних особливостей рослин. У 2020 році зимостійкість рослин була меншою і склала 90,5% проти 91,8% в умовах 2021 року. Розміщення пшениці після озимого ріпаку забезпечувало більш високу зимостійкість рослин пшениці озимої на час припинення осінньої вегетації порівняно з попередниками соя та соняшник. Більш високу зимостійкість мають рослини сортів Даринка Київська та Золотоколоса. В умовах 2020 року зимостійкість рослин цих сортів відповідно становила 91,7 та 93,3%, а у 2021 році сортів Золотоколоса та Фаворитка 94,4 та 93%.
5. Кущистість на початку фази трубкування рослин досліджуваних сортів пшениці озимої на час припинення осінньої вегетації залежала від погодних умов, попередників та генетичних особливостей рослин. У 2020 році кущистість на початку фази трубкування рослин була більшою і склала 2,9 шт./рослину проти 2,8 шт./рослину в умовах 2021 року. Розміщення пшениці після озимого ріпаку забезпечувало більш високу кущистість на початку фази трубкування рослин пшениці озимої на час припинення осінньої вегетації порівняно з попередниками соя та соняшник. Більш високу кущистість на

фази трубкування мають рослини сортів Кубус та Скаген. В умовах 2020 року куцистисть на початку фази трубкування рослин цих сортів відповідно становила 3,1 та 3,2 шт./рослину, а у 2021 році 2,9 та 2,9 шт./рослину.

6. Урожайність рослин досліджуваних сортів пшениці озимої на час припинення осінньої вегетації залежала від погодних умов, попередників та генетичних особливостей рослин. У 2020 році урожайність рослин була меншою і склала 32,3 ц/га проти 55,5 ц/га в умовах 2021 року. Розміщення пшениці після озимого ріпаку забезпечувало більш високу урожайність рослин пшениці озимої на час припинення осінньої вегетації порівняно з попередниками соя та соняшник. Більш високу урожайність мають рослини сортів Даринка Київська та Новокиївська. В умовах 2020 року урожайність рослин цих сортів відповідно становила 38,6 та 35,9 ц/га, а у 2021 році сортів Балетка та Кубус 58,9 та 58,7 ц/га.
7. Сільськогосподарським підприємствам рекомендуємо при розміщенні пшениці озимої після озимого ріпаку та стерньового попередника використовувати сорт Даринка Київська. Умовно чистий дохід відповідно становить 23543 та 15286 грн./га, а розрахунковий рівень рентабельності відповідно 181,7 та 120,8%. Після сої на зерно рекомендуємо вирощувати сорт Золотоколоса. Його вирощування забезпечує отримання умовно чистого доходу на рівні 19615 грн/га, а розрахунковий рівень рентабельності становить 19615 грн./га.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Базалій В. В. Адаптивний потенціал сортів пшениці м'якої озимої залежно від умов вирощування / В. В. Базалій, О. В. Ларченко, Ю. О. Лавриненко, Г. Г. Базалій // Фактори експериментальної еволюції організмів. К.: Логос, 2009. Т. 6. С. 272-276.
2. Гончарук В. Я. Сортів рослинні ресурси України на 2008 рік. / В. Я. Гончарук, М. І Загинайло // Сортівивчення та охорона прав на сорти рослин. 2008. 1 (7). С. 44-49
3. Гурьев Б. П. Методика подбора сортов зерновых культур для возделования по интенсивной технологии / Б. П. Гурьев, П. П. Литун, В. В. Волкодав, В. Ф. Садовничий // Селекция и семеноводство. 1988. Вып. 65. С. 3-8.
4. Зерновые культуры (выращивание, уборка, доработка и использование): учебно-практ. рук. / [Д. Шпаар, Х. Гинапп, Д. Дрегер и др.]; под. ред. Д. Шпаара. [3-е изд.]. М.: ИД ООО «DLV Агродело», 2008. 656 с.
5. Кочмаровський В. С. Як нам стабілізувати виробництво зерна / В. С. Кочмаровський // Насінництво. 2010. № 9. С. 3-5.
6. Крупнов В. А. О создании изогенных линий твердой и мягкой пшеницы, адаптированных к условиям Поволжья / В. А. Крупнов // Сельскохозяйственная биология. 1995. № 5. С. 31-37.
7. Литвиненко В. А. Корекція моделі сорту озимої м'якої пшениці універсального типу для умов півдня України в зв'язку зі змінами клімату / М. А. Литвиненко // Вісн. Білоцерк. держ. аграр. ун-ту: зб. наук. праць. 2008. Вип. 52. С. 18-25.
8. Мазур В.А., Поліщук І.С., Телекало Н.В., Мордванюк М.О. РОСЛИННИЦТВО Навчальний посібник (І частина) Вінниця: Видавництво ТОВ «Друк». 2020. С.71-92

9. Моргун В. В. Потенціал сорта как основа урожайности пшеницы / В. Моргун // Зерно. 2010. №5. С. 24-30.
10. Моргун В. В. Селекція сортів озимої пшениці на високу зимоста морозостійкість / В. В. Моргун, В. Ф. Логвиненко // Фізіологія рослин в Україні за межі тисячоліття 2001. Т. 2. С. 204-211.
11. Особливості технологій вирощування озимих зернових культур під урожай 2019 року (осінній комплекс робіт): рекомендації. Оброшино : [Б. в.], 2018. 48 с.
12. Селекція і насінництво сільськогосподарських рослин: [підр. для студ. вищ. навч. закл.] / М. Я. Молоцький, Л. П. Васильківський, В. І. Князюк, В. А. Власенко. К.: Вища освіта, 2006. 463 с.
13. Уліч Л. І. Посухостійкість сортів пшениці озимої, придатних до поширення в Україні / Л. І. Уліч, Л. П. Бочкарьова, В. М. Лисікова, О. В. Семеніхін // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. 2008. № 1(7). С. 106-114.
14. Чайка В. Г. Роль прискореної сортозаміни озимої пшениці у вирішенні проблеми зерновиробництва. / В. Г. Чайка, В. В. Вешневський, С. М. Неменуца // Стан і перспективи формування сортових рослинних ресурсів в Україні: перша міжн. наук.-практ. конф., 11-12 лип. 2012 р. : тези доп. К., 2012. Київ, 2012. С. 283-285.
15. Грицаєнко З.М. Методи біологічних та агрохімічних досліджень рослин і ґрунтів /З.М. Грицаєнко, А.О. Грицаєнко, В.П. Карпенко К.: ЗАТ „НІЧЛАВА”, 2003. С. 17-18
16. Департамент екології та природних ресурсів кіровоградської обласної державної адміністрації. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища Кіровоградської області у 2016 році (2017 рік) <https://mepr.gov.ua/files/docs/Reg.report/>

17. Дорош О.С. Теоретико-методологічні засади територіального планування землекористування: монографія. Херсон: Грінь Д. С., 2012. 434 с
18. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований) / Б.А. Доспехов. 5-е изд., доп. и перераб. М.: Агропромиздат, 1985. 351 с.
19. Екологічний паспорт кіровоградської області за 2019 рік (2020 р.) 122 с. <http://ekolog.kr-admin.gov.ua/item/700-ekolohichnyy-pasport-kirovohradskoyi-oblasti-2018-rik/700-ekolohichnyy-pasport-kirovohradskoyi-oblasti-2018-rik>
20. Єщенко В.О. Основи наукових досліджень в агрономії: Підручник /В.О. Єщенко, П.Г. Копитко, П.В. Костогриз, В.П. Опришко; за ред. В.О. Єщенка. Вінниця: ПП «ТД «Едельвейс і К» », 2014. 332 с.
21. Зайцев Г.Н. Математическая статистика в экспериментальной ботанике. М.: Наука, 1984. 424 с.
22. Конишева О. Правове забезпечення запобігання деградації земель сільськогосподарського призначення: дис. канд. юрид. наук: 12.00.06. Х., 2002. 175 с
23. Крисанов Д.Ф. Економіко-екологічні проблеми харчової промисловості України: монографія. М.: Інститут економіки НАН України, 2002. 259 с.
24. Мойсейченко В.Ф. Основи наукових досліджень в агрономії /В.Ф. Мойсейченко, В.О. Єщенко К.: Вища шк., 1994. С. 50-51.
25. Омелюта В.П. Облік шкідників та хвороб сільськогосподарських культур / В.П. Омелюта, І.В. Григорович, В.С. Чабан та ін. / За ред. В.П. Омелюти. Київ: Урожай, 1986. 296 с.
26. Панас Р.С. Раціональне використання та охорона земель: навч. посібн. Львів: Новий Світ, 2008. 352 с.

27. Сментина Н.В. Стратегічне планування соціально&економічного розвитку на мезорівні: теорія, методологія, практика: монографія. Одеса: Атлант, 2015. 175 с.
28. Смирнова С.М., Смирнов В.М., Мась А.Ю., Шаповаленко Д.Р.
29. Стратегічне планування використання земель. Агросвіт. № 1-2, 2021. С.82-89
30. Дегдяренко Т., Левченко В. О. Агропромисловий комплекс - травмонебезпечна галузь виробництва.Охорона праці. 1999. №8. С.32-33.
31. Закон України «про охорону праці»
<http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2694-12>
32. Дрожжана О.У., Ясько В.О.
<http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/>
33. Особливості охорони праці в галузях сільського господарства
https://pidru4niki.com/1211070857570/pravo/osoblivosti_ohoroni_pratsi_galuzyah_silskogo_gospodarstva
34. Охорона праці при вирощуванні сільськогосподарських культур: Навчальний посібник / М.М.Сакун, В.Ф. Нагорнюк; Одеський державний аграрний університет/. Кафедра безпеки життєдіяльності. Одеса. 2009.
35. Целінський В.П. Охорона праці в рослинництві. К.: Урожай. 1991. 84 с.
36. Черкунов Н.Е. Охрана труда при работе с минеральными удобрениями и пестицидами. М.: Россельхозиздат.1985.160 с.
37. Шудренко І. В. Охорона праці в галузі: навч. посіб. Житомир: ЖНАЕУ, 2017. 136 с. С.8-18.
38. Щодо вдосконалення агроекологічних умов функціонування сільського господарства". Аналітична

записка<https://niss.gov.ua/doslidzhennya/ekonomika/schodo-vdoskonalennya-agroekologichnikh-umov-funkcionuvannya-silskogo>

39. <https://u.farmafans.ru/svini/31838-vse-pro-ozimoi-pshenici-ii-osoblivosti-posiv.html>
40. <https://superagronom.com/news/3450-top-15-naypopulyarnishih-vitchiznyanih-sortiv-ozimoyi-pshenitsi>
41. <https://www.agronom.com.ua/adaptyvni-sorty-pshenytsi-ozymoyi-dlya-pidzony-perehodu-lisostepu-v-step/>
42. <https://www.twirpx.com/file/3169569/>
43. <http://rada-novomirgorod.gov.ua/storage/docs/64780f87-3648-47a0-93c6-b9edfc4cbfbd.PDF>
44. [.http://ekolog.kr-admin.gov.ua/item/700-ekolohichnyy-pasport-kirovohradskoyi-oblasti-2018-rik/700-ekolohichnyy-pasport-kirovohradskoyi-oblasti-2018-rik](http://ekolog.kr-admin.gov.ua/item/700-ekolohichnyy-pasport-kirovohradskoyi-oblasti-2018-rik/700-ekolohichnyy-pasport-kirovohradskoyi-oblasti-2018-rik)
45. <http://rada-novomirgorod.gov.ua/storage/docs/64780f87-3648-47a0-93c6-b9edfc4cbfbd.PDF>
46. <http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100019816-sluzhba-okhoroni-pratsi-chi-obov'yazkovo-stvoryuvati-na-pidpriyemstvi>
47. <https://dsp.gov.ua/faq/osnovni-funktsii-sluzhby-okhorony-pratsi/>
48. <https://oppb.com.ua/articles/organizaciya-roboty-sluzhby-okhorony-praci-na-pidpriyemstvi>
49. <https://oppb.com.ua/content/vymogy-okhorony-praci-pry-provedenni-posivnyh-robit>
50. <https://oppb.com.ua/news/vymogy-bezpeky-ta-okhorony-praci-pry-pidgotovci-ta-vykonanni-vesnyano-polovyh-robit>
51. <https://docsportal.net/4458287/>

ДОДАТКИ

Додаток А

Технологічні карти після попередника стерньовий

Тех.карта 1.

Технологічна карта																							
Культура	Основа пшениця	Норма висіву, кг/га	220	Прогнозний, л (Вівіант - 200г/га)	55	Урожайність, ц/га		Валовий збір, ц															
Сорт	Полонка	Всього насіння, т	22	Гербіцид, л (Діна 0,5 л/га)	50																		
Попередник	стерньовий	Система удобрення	№,Р,К,г+№ _м	інсектицид, л (Бі-58 0,75 л/га)	75	зерна		35															
Площа, га	100	Всього туків, т	20	9 фунгіцид, л (Аліро супер 0,5 л/га)	50																		
Перший строк сієви																							
Найменування робіт	Одним.	Обсяг робіт у фіз. од. в умов. га	трактори, автомоб.	с. т. машини	Обслуговуваний персонал				Норма виробітку	Кількість нормованих	Затрати праці, люд.-год		Оплата праці по тарифу на весь обсяг робіт, грн.	Разом витрат на оплату праці, грн.	Підприємство		Всього затрат, грн.						
					кількість машиністів	розряд роботи	Розціна, грн/га	кількість працівників			розряд роботи	Розціна, грн/га			механізатори	інші		механізатори	інші	на од.роб.	кількість, л	Вартість, всього грн.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Душення сорняків в два спливи	га	200	53,9	Т-150К	ДПТ-10	1	V	16,33				49	4,1	32,7		3265,6		3265,6	3	600	15720,0	18986	
Перепосівна культивация	га	100	39,7	Т-150К	ДПТ-4	1	V	26,49				30,2	3,3	26,5		2649,3		2649,3	4,5	450	11790,0	14439	
Протрушування насіння	т	22		ПС-10		1	IV	75,01	2	III	5,07	8	2,8	16,5	33,0	1650,2	223,1	1873,2	кВт-год	165	323	2197	
Нав'язування насіння і добрив	т	42		ЗП-60		1	V	9,41	2	II	0,56	85	0,5	4,0	7,9		47,3	47,3	кВт-год	40	77	125	
Транспортування насіння і добрив	т	42		ТАЗ-53		1		7,26				погод.	2,9	22,9		165,9		165,9		50	1310,0	1476	
Сівба з внесенням добрив	га	100	13,7	ХТЗ-170	(зем. маш. 35000)	1	V	22,86	1	III	1,55	35	2,9	22,9	22,9	2285,9	154,5	2440,5	3,5	350	9170,0	11610	
Протрушування посівів	га	100	11,2	МТЗ-80	ЗКШ-6	1	II	16,00				50	2,0	16,0		1600,2		1600,2	1,9	190	4978,0	6578	
Воронування посівів навесні	га	100	26,7	Т-150	СТ-21+ВЗСС-1	1	V	17,78				45	2,2	17,8		1778,0		1778,0	1,5	150	3930,0	5708	
Транспортування добрив	т	9		ТАЗ-53		1		7,26				погод.	2,4	19,0		138,3		138,3		50	1310,0	1448	
Підживлення 1 р - 0,9 ц/га	га	100	13,3	МТЗ-80	МБД-900	1	IV	19,05				42	2,4	19,0		1905,0		1905,0	1,51	151	3956,2	5861	
Транспортування води і оргудобривів	т	80		ТАЗ-53		1		7,26				погод.	2,0	12,0		87,1		87,1		25	655,0	742	
Внесення гербіцидів та фунгіцидів	га	100	5,1	Лавей	самолет	1	VI	9,56	1	IV	0,67	70	1,4	8,6	11,4	956,4	66,5	1022,9	1,3	130	3406,0	4429	
Транспортування води і оргудобривів	т	160		ТАЗ-53		1		7,26				погод.	1,4	8,6		62,2		62,2		25	655,0	717	
Внесення інсектицидів	га	100	5,1	Лавей	самолет	1	VI	9,56	1	IV	0,67	70	1,4	8,6	11,4	956,4	66,5	1022,9	1,3	130	3406,0	4429	
Збірвання врожаю	га	100		Джон-Дір		2	VI	57,59				15,5	6,5	103,2		11517,9		11517,9	8,3	830	21746,0	32564	
Транспортування зерна	т	367,5		ТАЗ-53		2		7,26				погод.	6,5	103,2		1498,8		1498,8		276	7221,4	8720	
Очистка зерна	т	367,5		Патрус		1	V	68,38	4	III	4,62	11,7	31,4	251,3	1005	25130,7	6794,7	31925,4	кВт-год	2513	4925,1	36851	
Разом по культурі		169											693	1092	55648	7353	63001		3407	89254	11610		

Технологічна карта

Культура	Омега пшениця	Норма висіву, кг/га	220	Прогнозний, л (Визнач. 200#Ф)	55	Урожайність, ш/га	Важкий бор, ц																
Сорт	Фаворита	Всього насіння, т	22	Гербіцид, л (Діюна 0,5 л/га)	50																		
Попережник	старканий	Система удобрення	№Р,кг,м³,№	інсектицид, л (Бі-58 0,75 л/га)	75	зарина	38,7																
Площа, га	100	Всього гудів, т	20	9 фунтів, л (Амло стар 0,5 л/га)	50		3870																
Перший строк сіви																							
Найменування робіт	Одним.	Обсяг робіт	Спосіб вжитку	Обслуговуючий персонал		Норма виробітку	Кількість нормовизміт	Зарплати праців. люд.-год		Оплата праці по тарифу на весь обсяг робіт, грн.	Разом витрат на оплату праці,грн.	Паливе		Всього затрат,грн.									
				транспортно-машини	робітники ручної праці			механізатори	інші			механізатори	інші		кількість, л	Вартість, всього грн.							
				розряд роботи	Розцінка, грн/га			розряд роботи	Розцінка, грн/га						на одроб.	всього							
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Підпушення стовнів в даш стіли	га	200	53,9	Т-150К	ДШ-10	1	V	16,3		49	4,1	32,7		3265,6	3265,6	3	600	15720,0	18988				
Першосівна культивация	га	100	39,7	Т-150К	2ХТС-4	1	V	26,49		30,2	3,3	26,5		2649,3	2649,3	4,5	450	11790,0	14439				
Протручування насіння	т	22		ПС-10		1	IV	75,01	2	III	5,07	8	2,8	16,5	33,0	1650,2	223,1	1873,2	кВт-год	165	323	2197	
Навіантаження насіння і добрив	т	42		ЗП-60		1	V	94,1	2	II	0,56	85	0,5	4,0	7,9		47,3	кВт-год	40	77	125		
Транспортування насіння і добрив	т	42		ГАЗ-53		1		7,26				погод	2,9	22,9		165,9		165,9		50	1310,0	1476	
Сівба з внесенням добрив	га	100	13,7	ХТЗ-170	(Great Puma 38000)	1	V	22,86	1	III	1,55	35	2,9	22,9	22,9	2285,9	154,5	2440,5	3,5	350	9710,0	11610	
Підпукування посівів	га	100	11,2	МТЗ-80	ЭКШ-6	1	II	16,00		50	2,0	16,0		1600,2		1600,2	1,9	190	4978,0	6578			
Воронування посівів навісні	га	100	26,7	Т-150	СТ-21+БССТ-1	1	V	17,78		45	2,2	17,8		1778,0		1778,0	1,5	150	3930,0	5708			
Транспортування добрив	т	9		ГАЗ-53		1		7,26				погод	2,4	19,0		138,3		138,3		50	1310,0	1448	
Підживлення 1 р.-0,9 п/га	га	100	13,3	МТЗ-80	АБД-900	1	IV	19,05		42	2,4	19,0		1905,0		1905,0	1,51	151	3956,2	5861			
Транспортування води:																							
отрутоциклів	т	80		ГАЗ-53		1		7,26				погод	2,0	12,0		87,1		87,1		25	655,0	742	
Внесення гербіцидів та фунгіцидів	га	100	5,1	Левей	самолет	1	VI	9,56	1	IV	0,67	70	1,4	8,6	11,4	956,4	66,5	1022,9	1,3	130	3406,0	4429	
Транспортування води:																							
отрутоциклів	т	160		ГАЗ-53		1		7,26				погод	1,4	8,6		62,2		62,2		25	655,0	717	
Внесення інсектицидів	га	100	5,1	Левей	самолет	1	VI	9,56	1	IV	0,67	70	1,4	8,6	11,4	956,4	66,5	1022,9	1,3	130	3406,0	4429	
Збірвання врожаю	га	100		Джон-Дір		2	VI	57,59		15,5	6,5	103,2		11517,9		#####	8,3	830	21746,0	33264			
Транспортування зерна	т	406,4		ГАЗ-53		2		7,26				погод	6,5	103,2		1498,8		1498,8		305	7984,8	9484	
Осіння зерпа	т	406,4		Петрус		1	V	68,38	4	III	4,62	11,7	34,7	277,8	1111	2778,4	7513,0	#####	кВт-год	2778	5454,8	40746,2	
Разом по культурі			169												719	1198	58305	8071	66375	3436	90017	#####	

Тех.карта 3.

Технологічна карта

Культура	Озима пшениця	Норма висіву, кг/га	220	Протруєння, л (Бігавек -100*#)	55	Урожайність, ц/га	Ваговий збір, ц
Сорт	Золотолоса	Всього насіння, т	22	Гербіцид, л (Грім 0,5 л/га)	50		
Попередник	стернговий	Система удобрення	№,Р,К,а*№	інсектицид, л (Бі-58 0,5 л/га)	75	зерна	3800
Площа, га	100	Всього гудів, т	20	фунгіцид, л (Аліро супер 0,5 л/га)	50		

Перший строк сієби

Найменування робіт	Одиниц.	Обсяг робіт		Склад агрегату			Обслуговуючий персонал						Норма виробітку	Кількість нормозмін	Затрати праці, люд.-год		Оплата праці по тарифу на вагу обсяг робіт, грн.	Разом витрати на оплату праці, грн.	Платня					
		у фіз.од.	в умов.га	трактори, автомоб.	с.г.машини	трактористи-машиністи		робітники ручної праці		механізатори	інші	механізатори			інші	на одроб.			всього	Вартість, всего грн.	Всього затрат, грн.			
						кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість													розряд роботи	Розцінка, грн/га	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
Дужею стерні в дзв.стільц	га	200	53,9	Т-150К	ДП-10	1	V	16,33				49	4,1	32,7		3265,6		3265,6	3	600	15720,0	18986		
Передпосівна культивація	га	100	39,7	Т-150К	2КПС-4	1	V	26,49				30,2	3,3	26,5		2649,3		2649,3	4,5	450	11790,0	14439		
Протруєвання насіння	т	22		ПС-10		1	IV	75,01	2	III	5,07	8	2,8	16,5	33,0	1650,2	223,1	1873,2	№7-100	165	323	2197		
Навігаження насіння і добрив	т	42		ЗП-60		1	V	9,41	2	II	0,56	85	0,5	4,0	7,9		47,3	47,3	№7-100	40	77	125		
Транспортування насіння і добрив	т	42		ГАЗ-53		1		7,26				погод.	2,9	22,9		165,9		165,9		50	1310,0	1476		
Сівба з внесенням добрив	га	100	13,7	ХТЗ-170	(середній 854000)	1	V	22,86	1	III	1,55	35	2,9	22,9	22,9	2283,9	154,5	2440,5	3,5	350	9170,0	11610		
Підготовлення посівів	га	100	11,2	МТЗ-80	ЗКХШ-6	1	II	16,00				50	2,0	16,0		1600,2		1600,2	1,9	190	4978,0	6578		
Воронування посівів насіння	га	100	26,7	Т-150	СТ-21-ВЗСС-1	1	V	17,78				45	2,2	17,8		1778,0		1778,0	1,5	150	3930,0	5708		
Транспортування добрив	т	9		ГАЗ-53		1		7,26				погод.	2,4	19,0		138,3		138,3		50	1310,0	1448		
Підкормлення 1 р - 0,9 ц/га	га	100	13,3	МТЗ-80	МВЛ-900	1	IV	18,05				42	2,4	19,0		1805,0		1905,0	1,51	151	3956,2	5861		
Транспортування води і оргутокмікації	т	80		ГАЗ-53		1		7,26				погод.	2,0	12,0		87,1		87,1		25	655,0	742		
Внесення гербіцидів та фунгіцидів	га	100	5,1	Лават	самолет	1	VI	9,56	1	IV	0,67	70	1,4	8,6	11,4	956,4	66,5	1022,9	1,3	130	3406,0	4429		
Транспортування води і оргутокмікації	т	160		ГАЗ-53		1		7,26				погод.	1,4	8,6		62,2		62,2		25	655,0	717		
Внесення інсектицидів	га	100	5,1	Лават	самолет	1	VI	9,56	1	IV	0,67	70	1,4	8,6	11,4	956,4	66,5	1022,9	1,3	130	3406,0	4429		
Збірвання врожаю	га	100		Джон-Дір		2	VI	57,59				15,5	6,5	103,2		11517,9		11517,9	8,3	830	21746,0	33264		
Транспортування зерна	т	399		ГАЗ-53		2		7,26				погод.	6,5	103,2		1498,8		1498,8		299	7840,4	9339		
Очистка зерна	т	399		Петрус		1	V	68,38	4	III	4,62	11,7	34,1	272,8	1091	27284,8	7377,1	#####	№7-100	2728	5347,3	40009		
Всього по культурі			169											714	1178	57802	7935	65737		3430	89873	#####		

Первый срок c160n

[illegible]

Тех.карта 5.

Технологічна карта																											
Культура	Орпаді пшениця	Норма висіву, кг/га	220	Прогнозний, л (Вівіант - 200#)	55	Урожайність, ц/га		Валовий збір, ц																			
Сорт	Кубус	Всього насіння, т	22	Тербица, л (Гібрид 0,5 л/га)	50																						
Попередник	стерньовий	Система удобрення	Н.Р.К.г.г. №	інтенсиви, л (Ві-58 0,5 л/га)	75	зерна		37,5		3750																	
Площа, га	100	Всього туків, т	20	фунтіца, л (Агро супер 0,5 л/га)	50																						
Перший строк сієби																											
Найменування робіт	Одн.в.	Обсяг робіт		Специ агрегату		Обслуговувачий персонал						Норма виробітку		Кількість нормозмін		Зарплата праців. люд-гоп		Оплата праці по тарифу на весь обсяг робіт, грн.		Разом витрат на ошту праців.г.г.		Ціліше		Всього затрат, грн.			
		у фіз. од.	в умов. га	трактори, автомоб.	с.т. машини	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га			механізатори	валі	механізатори	валі					на одроб.	кількість, л		всього	Вартість, всього грн.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
Душення сирни в два сіїли	га	200	53,9	Т-150К	ДП-10	1	V	16,33				49	4,1	32,7		3265,6		3265,6	3	600	15720,0	18986					
Передпосівна культивація	га	100	39,7	Т-150К	ДП-4	1	V	26,49				30,2	3,3	26,5		2649,3		2649,3	4,5	450	11790,0	14439					
Прогружування насіння	т	22		ПС-10		1	IV	75,01	2	III	5,07	8	2,8	16,5	33,0	1650,2	223,1	1873,2	кВт-гоп	165	323	2197					
Навігуювання насіння і добрив	т	42		ЗП-60		1	V	94,1	2	II	0,56	85	0,5	4,0	7,9		47,3	47,3	кВт-гоп	40	77	125					
Транспортування насіння і добрив	т	42		ТА-53		1		7,26				пошт.	2,9	22,9		165,9		165,9		50	1310,0	1476					
Сівба з внесенням добрив	га	100	13,7	ХТЗ-170	Біла Річка 184000	1	V	22,86	1	III	1,55	35	2,9	22,9	22,9	2285,9	154,5	2440,5	3,5	350	9170,0	11610					
Прогружування посіва	га	100	11,2	АПЗ-80	ЗКСШ-6	1	II	16,00				50	2,0	16,0		1600,2		1600,2	1,9	190	4978,0	6578					
Воронування посіва насінні	га	100	26,7	Т-150	СТ-21-ВЗС-1	1	V	17,78				45	2,2	17,8		1778,0		1778,0	1,5	150	3930,0	5708					
Транспортування добрив	т	9		ТА-53		1		7,26				пошт.	2,4	19,0		138,3		138,3		50	1310,0	1448					
Підживлення 1-р-0,9 л/га	га	100	13,3	АПЗ-80	АПД-900	1	IV	19,05				42	2,4	19,0		1905,0		1905,0	1,51	151	3956,2	5861					
Транспортування води і отрутохімікатів	т	80		ТА-53		1		7,26				пошт.	2,0	12,0		87,1		87,1		25	655,0	742					
Внесення гербіцидів та фунгіцидів	га	100	5,1	Лави	самолет	1	VI	9,56	1	IV	0,67	70	1,4	8,6	11,4	956,4	66,5	1022,9	1,3	130	3406,0	4429					
Транспортування води і отрутохімікатів	т	160		ТА-53		1		7,26				пошт.	1,4	8,6		62,2		62,2		25	655,0	717					
Внесення інсектицидів	га	100	5,1	Лави	самолет	1	VI	9,56	1	IV	0,67	70	1,4	8,6	11,4	956,4	66,5	1022,9	1,3	130	3406,0	4429					
Збірвання врожаю	га	100		Джон-Дір		2	VI	57,29				15,5	6,5	103,2		11517,9		11517,9		8,3	830	21746,0	33254				
Транспортування зерна	т	393,8		ТА-53		2		7,26				пошт.	6,5	103,2		1498,8		1498,8		295	7737,2	9216					
Очистка зерна	т	393,8		Центус		1	V	68,38	4	III	4,62	11,7	33,7	269,2	1077	26925,8	7280,0	34205,8	кВт-гоп	2692	5776,9	39483					
Разом по культурі			169											711	1164	57443	7838	65281		3426	89769	11610					

Тех.карта 6.

Технологічна карта																						
Культура	Овина пшениця	Норма висіву, кг/га	220	Пророщуван. л (Візнавк. 200#)	55	Урожайність, ц/га		Валовий збір, ц														
Сорт	Балетка	Всього насіння, т	22	Гербіцид л (Діріна 0,5 л/га)	50																	
Попередник	стерильний	Система удобрення	N ₄ P ₄ K ₄ +N ₄	інсектицид л (Фі-58 0,5 л/га)	75	зерна		37,6	3760													
Площа, га	100	Всього т/га, т	20	фунгіцид л (Аліго супер 0,5 л/га)	50																	
Перший строк сієби																						
Найменування робіт	Одн.вм.	Обсяг робіт	Сила агрегату	Обслуговувачий персонал				Норма виробітку	Кількість нормозміст		Затрати праці, люд-год		Оплата праці по тарифу на весь обсяг робіт, грн		Разом витрат на оплату праці, грн.	Планне		Всього затрат, грн.				
				трактористи-машиністи	робітники ручної праці	механізатори	інші		механізатори	інші	на одроб.	всього										
													розряд роботи	Розцінка, грн/га		кількість	розряд роботи		Розцінка, грн/га	кількість, л	всього	
																						розряд роботи
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Пущення стерні в лав стіли	га	200	53,9	T-150K	ДПТ-10	1	V	16,33				49	4,1	32,7		3265,6		3265,6	3	600	15720,0	18986
Передпосівна культивування	га	100	39,7	T-150K	2KTC-4	1	V	26,49				30,2	3,3	26,5		2649,3		2649,3	4,5	450	11790,0	14439
Прогружування насіння	т	22		ПТС-10		1	IV	75,01	2	III	5,07	8	2,8	16,5	33,0	1650,2	223,1	1873,2	487+708	165	323	2197
Навантаження насіння і добрива	т	42		ЗП-60		1	V	9,41	2	II	0,56	85	0,5	4,0	7,9		47,3	47,3	487+708	40	77	125
Транспортування насіння і добрива	т	42		ГАЗ-53		1		7,26				потом	2,9	22,9		165,9		165,9		50	1310,0	1476
Сівба з внесенням добрива	га	100	13,7	ХТЗ-170	Сивал (Висв. 34000)	1	V	22,86	1	III	1,55	35	2,9	22,9	22,9	2285,9	154,5	2440,5	3,5	350	9170,0	11610
Прямочування посіва	га	100	11,2	МТЗ-80	ЗКХШ-6	1	II	16,00				50	2,0	16,0		1600,2		1600,2	1,9	190	4978,0	6578
Воронування посіва навалі	га	100	26,7	T-150	СТ-21-БКС-1	1	V	17,78				45	2,2	17,8		1778,0		1778,0	1,5	150	3930,0	5708
Транспортування добрива	т	9		ГАЗ-53		1		7,26				потом	2,4	19,0		138,3		138,3		50	1310,0	1448
Підживлення 1 р.-0,9 ц/га	га	100	13,3	МТЗ-80	МВТ-900	1	IV	19,05				42	2,4	19,0		1905,0		1905,0	1,51	151	3956,2	5861
Транспортування води і оргутолініків	т	80		ГАЗ-53		1		7,26				потом	2,0	12,0		87,1		87,1		25	655,0	742
Внесення гербіцидів та фунгіцидів	га	100	5,1	Лавел	самоход	1	VI	9,56	1	IV	0,67	70	1,4	8,6	11,4	956,4	66,5	1022,9	1,3	130	3406,0	4429
оргутолініків	т	160		ГАЗ-53		1		7,26				потом	1,4	8,6		62,2		62,2		25	655,0	717
Внесення інсектицидів	га	100	5,1	Лавел	самоход	1	VI	9,56	1	IV	0,67	70	1,4	8,6	11,4	956,4	66,5	1022,9	1,3	130	3406,0	4429
Збірвання врожаю	га	100		Джон-Дір		2	VI	57,59				15,5	6,5	103,2		11517,9		11517,9	8,3	830	21746,0	33264
Транспортування зерна	т	394,8		ГАЗ-53		2		7,26				потом	6,5	103,2		1498,8		1498,8		296	7757,8	9257
Очистка зерна	т	394,8		Пенікс		1	V	68,38	4	III	4,62	11,7	33,7	269,9	1080	26997,6	7299,4	34287,0	487+708	2699	5291	39588
Всього по культурі			169										711	1166		57515	7857	65372		3427	89790	111111

Тех.карта 7.

Технологічна карта

Культура	Озима пшениця	Норма висіву, кг/га	220	Прогрунтя, л (Візіакс - 200#Ф)	55	Урожайність, ц/га		Ваговий збір, ц
Сорт	Скаген	Всього насіння, т	22	Тербица, л (Діріа 0,5 л/га)	50			
Попередник	стерньовий	Система удобрення	N ₁₂₀ K ₆₀ +N ₈₀	інсектициди, л (Бі-58 0,75 л/га)	75	зерна		36,3
Площа, га	100	Всього тупів, т	20	фунгіциди, л (Аліро супер 0,5 л/га)	50			3630

Перший строк сієви

Найменування робіт	Одиниця	Обсяг робіт			Склад агрегату			Обслуговувачий персонал						Норма виробітку	Кількість нормовизвів	Затрати праці, люд-год		Оплата праці по тарифу на весь обсяг робіт, грн.		Разом витрати на оплату праці, грн.	Підсум			Всього затрат, грн.
		у фіз. од.	в умов. га	тракторист, автомоб.	с.ч. машинистів	тракторист-машинист		робітники ручної праці		механізатори	інші	механізатори	інші			на одню особу	всього	Вартість, всього грн.						
						кількість	розряд роботи	Розрядність, грн/га	кількість										розряд роботи		Розрядність, грн/га			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
Душення стерні в два сліди	га	200	53,9	Т-150К	ДП-10	1	V	16,33				49	4,1	32,7		3265,6		3265,6	3	600	15720,0	18986		
Препарування культури	га	100	39,7	Т-150К	2КПС-4	1	V	26,49				30,2	3,3	26,5		2649,3		2649,3	4,5	450	11790,0	14439		
Прогрунтя насіння	т	22		ПС-10		1	IV	75,01	2	III	5,07	8	2,8	16,5	33,0	1650,2	223,1	1873,2	кВт-год	165	323	2197		
Навантаження насіння і добрив	т	42		ЗП-60		1	V	9,41	2	II	0,56	85	0,5	4,0	7,9		47,3	47,3	кВт-год	40	77	125		
Транспортування насіння і добрив	т	42		ГАЗ-53		1		7,26				потра	2,9	22,9		165,9		165,9		50	1310,0	1476		
Сівба з внесенням добрив	га	100	13,7	ХТЗ-170	Great Wall 35000	1	V	22,86	1	III	1,55	35	2,9	22,9	22,9	2285,9	154,5	2440,5	3,5	350	9170,0	11610		
Примочування посівів	га	100	11,2	МТЗ-80	ЗКСШ-6	1	II	16,00				50	2,0	16,0		1600,2		1600,2	1,9	190	4978,0	6578		
Воронування посівів навесні	га	100	26,7	Т-150	СТ-21+ВСС-1	1	V	17,78				45	2,2	17,8		1778,0		1778,0	1,5	150	3930,0	5708		
Транспортування добрив	т	9		ГАЗ-53		1		7,26				потра	2,4	19,0		138,3		138,3		50	1310,0	1448		
Підкормлення і р-0,9 ц/га	га	100	13,3	МТЗ-80	МБД-900	1	IV	19,05				42	2,4	19,0		1905,0		1905,0	1,51	151	3956,2	5861		
Транспортування води і отрутохімікатів	т	80		ГАЗ-53		1		7,26				потра	2,0	12,0		87,1		87,1		25	655,0	742		
Внесення гербіцидів та фунгіцидів	га	100	5,1	Ланг	самолет	1	VI	9,56	1	IV	0,67	70	1,4	8,6	11,4	956,4	66,5	1022,9	1,3	130	3406,0	4429		
Транспортування води і отрутохімікатів	т	160		ГАЗ-53		1		7,26				потра	1,4	8,6		62,2		62,2		25	655,0	717		
Внесення інсектицидів	га	100	5,1	Ланг	самолет	1	VI	9,56	1	IV	0,67	70	1,4	8,6	11,4	956,4	66,5	1022,9	1,3	130	3406,0	4429		
Зорвання врожаю	га	100		Джон-Дір		2	VI	57,59				15,5	6,5	103,2		11517,9		11517,9	8,3	830	21746,0	33264		
Транспортування зерна	т	381,2		ГАЗ-53		2		7,26				потра	6,5	103,2		1498,8		1498,8		286	7489,6	8988		
Очистка зерна	т	381,2		Пелкус		1	V	68,38	4	III	4,62	11,7	32,6	260,6	104,2	26064,1	7047,0	33101,1	кВт-год	2606	5108,1	38219		
Разом по культурі		169												702	1129	56581	7605	64186		3417	89522	111111		

Перший крок сібін

Культура	Озима пшениця	Норма висіву, кг/га	220	Процурінка, л (Візанек - 200#)	55	Урожайність, ц/га	Валовий збір, ц
Сорт	Дерника Київська	Всього насіння, т	22	Гербицид, л (Діріна 0,5 л/га)	50		
Попережник	стерньовий	Система удобрення	№, Р, К ₂ O + N ₂	інсектицид, л (Ві-38 0,75 л/га)	75	зерна	40,5
Площа, га	100	Всього туків, т	20	фунгіцид, л (Аліго супер 0,5 л/га)	50		

Перший строк сіви

Найменування робіт	Одн. вим.	Склад агрегату	Обслуговуючий персонал						Норма виробітку	Кількість нормозмін	Заграти праці, мод-год		Оплата праці по тарифу на весь об'єкт робіт, грн.		Разом витрат на оплату праці, грн.		Підпис		Всього затрат, грн.			
			трактористи-машиністи		робітники ручної праці		кількість розряд робіт	Розцінка, грн/га			кількість розряд робіт	Розцінка, грн/га	механізатори	валі	механізатори	валі	на одобр.	всього		Вартість, всього грн.		
			кількість	розряд робіт	кількість	розряд робіт																
			у фіз. од.	в умов. га	трактори, автомоб.	с/г. машини	кількість	розряд робіт			Розцінка, грн/га	кількість	розряд робіт	Розцінка, грн/га	кількість, л	всього						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Підготовка ґрунту під сів	га	200	33,9	Т-150К	ДПТ-10	1	V	16,33				49	4,1	32,7		3265,6		3265,6	3	600	15720,0	18988
Підготовка ґрунту під сів	га	100	39,7	Т-150К	ДПТ-4	1	V	26,49				30,2	3,3	26,5		2649,3		2649,3	4,5	450	11790,0	14439
Протравлення насіння	т	22		ПС-10		1	IV	75,01	2	Ш	5,07	8	2,8	16,5	33,0	1650,2	223,1	1873,2	кВт-год	165	323	2197
Навантаження насіння і добрив	т	42		ЗП-60		1	V	9,41	2	Ш	0,56	85	0,5	4,0	7,9		47,3	47,3	кВт-год	40	77	125
Транспортування насіння і добрив	т	42		ГАЗ-53		1		7,26				потр.	2,9	22,9		165,9		165,9		50	1310,0	1476
Сівба з внесеним добривом	га	100	13,7	ХТЗ-170	(середній 154000)	1	V	22,86	1	Ш	1,55	35	2,9	22,9	22,9	2283,9	154,5	2440,5	3,5	350	9170,0	11610
Підготовка ґрунту посівів	га	100	11,2	МТЗ-80	ЗКШ-6	1	II	16,00				50	2,0	16,0		1600,2		1600,2	1,9	190	4978,0	6578
Воронування посівів навесні	га	100	26,7	Т-150	СТ-21-ВБС-1	1	V	17,78				45	2,2	17,8		1778,0		1778,0	1,5	150	3930,0	5708
Транспортування добрив	т	9		ГАЗ-53		1		7,26				потр.	2,4	19,0		138,3		138,3		50	1310,0	1448
Підживлення 1 р. 0,9 ц/га	га	100	13,3	МТЗ-80	МБТ-900	1	IV	19,05				42	2,4	19,0		1905,0		1905,0	1,51	151	3956,2	5861
Транспортування води і отрутоцидів	т	80		ГАЗ-53		1		7,26				потр.	2,0	12,0		87,1		87,1		25	655,0	742
Внесення гербицидів та фунгіцидів	га	100	5,1	Ланг	самолет	1	VI	9,56	1	IV	0,67	70	1,4	8,6	11,4	956,4	66,5	1022,9	1,3	130	3406,0	4429
Транспортування води і отрутоцидів	т	160		ГАЗ-53		1		7,26				потр.	1,4	8,6		62,2		62,2		25	655,0	717
Внесення інсектицидів	га	100	5,1	Ланг	самолет	1	VI	9,56	1	IV	0,67	70	1,4	8,6	11,4	956,4	66,5	1022,9	1,3	130	3406,0	4429
Збір зерна	га	100		Джон-Дір		2	VI	57,59				15,5	6,5	103,2		11517,9		11517,9		830	21746,0	33264
Транспортування зерна	т	4213		ГАЗ-53		2		7,26				потр.	6,5	103,2		1495,8		1495,8		319	8356,2	9835
Оплата зерна	т	4213		Петрус		1	V	68,38	4	Ш	4,62	11,7	36,3	280,8	1163	29079,8	7862,4	#####	кВт-год	2908	5699,1	42641
Разом по культурі			169											732	1250	59597	8420	68017		3450	90588	#####

Технологічні карти після попередника Озимий ріпак

Тех.карта 1.

Технологічна карта																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Культура	Основа пшениця	Норма висіву, кг/га	220	Протруйники, л (Вітасекс - 200г/г)	55	Урожайність, ц/га			Воловий збір, ц																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Сорт	Полонка	Всього насіння, т	22	Гербіцид, л (Гіфа 0,5 л/га)	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Попередник	Озимий ріпак	Система удобрення	№,Р,К,а+№	інсектициди, л (Ві-58 0,5 л/га)	75	зерна			48,2	4820																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Площа, га	100	Всього т/га, т	20	фунгіцид, л (Амго супер 0,5 л/га)	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Перший строк сієви																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Найменування робіт	Одним.	Обсяг робіт	Серед апарату	Обслуговуючий персонал								Зарплати праців. люд.-год		Оплата праці по тарифу на весь обсяг робіт, грн.		Разом витрат на оплату праці, грн.		Платіве		Всього затрат, грн.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				трактористи-машинисти	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість		розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість</

Тех.карта 2.

Технологічна карта																								
Культура	Озима пшениця	Норма висіву, кг/га	220	Прогнозування, л (Вівіанек - 2004#)	55	Урожайність, ц/га		Валовий збір, ц																
Сорт	Фаворитка	Всього насіння, т	22	Гербіцид, л (Гліфа 0,5 л/га)	50																			
Попередник	Озимий ріпак	Система удобрення	№, д, ж, р, №	інсектицид, л (Ві-38 0,5 л/га)	75	зерна		48,5		4850														
Площа, га	100	Всього тунів, т	20	фунгіцид, л (Аліро супер 0,5 л/га)		50																		
Перший строк сієви																								
Найменування робіт	Одним	Обсяг робіт	Спеці агрегату			Обслуговуючий персонал						Норма виробітку		Кількість нормозмін		Зарплата праці, люд-год		Оплата праці по тарифу на весь обсяг робіт, грн		Разом витрат на оплату праці, грн		Платня		Всього затрат, грн.
			у фіз. од.	в умов. га	трактори, автомоб.	с.ч. машин	трактористи-машинисти		робітники ручної праці		меканізатори					інші	меканізатори	інші	на одроб.			кількість, л	всього	
							кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість		розряд роботи	Розцінка, грн/га											
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
Пущення стріни в два сіїли	га	200	53,9	Т-150К	ДП-10	1	V	16,33				49	4,1	32,7		3265,6		3265,6	3	600	15720,0	18986		
Перешкосна культивация	га	100	39,7	Т-150К	2КПС-4	1	V	26,49				30,2	3,3	26,5		2649,3		2649,3	4,5	450	11790,0	14439		
Протручування насіння	т	22		ПС-10		1	IV	75,01	2	III	5,07	8	2,8	16,5	33,0	1650,2	223,1	1873,2	кВт-год	165	323	2197		
Навантажання насіння і добрив	т	42		ЗП-40		1	V	9,41	2	II	0,56	85	0,5	4,0	7,9		47,3	47,3	кВт-год	40	77	125		
Транспортування насіння і добрив	т	42		ГАЗ-53		1		7,26				погод.	2,9	22,9		165,9		165,9		50	1310,0	1476		
Сівба з висівками добрив	га	100	13,7	ХТЗ-170	Сівал (план 35400)	1	V	22,86	1	III	1,55	35	2,9	22,9	22,9	2285,9	154,5	2440,5	3,5	350	9170,0	11610		
Примочування посівів	га	100	11,2	МТЗ-80	ЗКШ-6	1	II	16,00				50	2,0	16,0		1600,2		1600,2	1,9	190	4978,0	6578		
Воронування посівів навесні	га	100	26,7	Т-150	СТ-21-БЗСС-1	1	V	17,78				45	2,2	17,8		1778,0		1778,0	1,5	150	3930,0	5708		
Транспортування добрив	т	9		ГАЗ-53		1		7,26				погод.	2,4	19,0		138,3		138,3		50	1310,0	1448		
Підживлення 1 р.-0,9 ц/га	га	100	13,3	МТЗ-80	МБД-900	1	IV	19,05				42	2,4	19,0		1905,0		1905,0	1,51	151	3956,2	5861		
Транспортування води і оргуток/ліків	т	80		ГАЗ-53		1		7,26				погод.	2,0	12,0		87,1		87,1		25	655,0	742		
Висівання гербіцидів та фунгіцидів	га	100	5,1	Лавел	самопод.	1	VI	9,56	1	IV	0,67	70	1,4	8,6	11,4	956,4	66,5	1022,9	1,3	130	3406,0	4429		
Транспортування води і оргуток/ліків	т	180		ГАЗ-53		1		7,26				погод.	1,4	8,6		62,2		62,2		25	655,0	717		
Висівання інсектицидів	га	100	5,1	Лавел	самопод.	1	VI	9,56	1	IV	0,67	70	1,4	8,6	11,4	956,4	66,5	1022,9	1,3	130	3406,0	4429		
Звернення врожаю	га	100		Джон-Дір		2	VI	57,59				15,5	6,5	103,2		11517,9		11517,9	8,3	830	21746,0	33264		
Транспортування зерна	т	509,3		ГАЗ-53		2		7,26				погод.	6,5	103,2		1498,8		1498,8		382	10006,8	11506		
Очистка зерна	т	509,3		Пелюс		1	V	68,38	4	III	4,62	11,7	43,5	348,2	1393	34824,0	9415,5	44239,5	кВт-год	3482	6824,8	51064		
Работи по культурі		169											790	1479	65341	9973	75315			3513	92039	101252		

Тех.карта 3.

Технологічна карта																																					
Культура	Однина пшениця	Норма висіву, кг/га	220	Прогрунтя, л (Вітанек - 200г/га)	55	Урожайність, ц/га		Валовий збір, ц																													
Сорт	Золотокопоса	Всього насіння, т	22	Тривішч. л (Тривіш 0,5 л/га)	50																																
Попередник	Опийний ріпак	Система удобрення	№,д,к,г+№	інкаспіція, л (Ві-58 0,75 л/га)	75	зерна		48		4800																											
Площа, га	100	Всього туків, т	20	9	фунтішч. л (Аліро супер 0,5 л/га)	50																															
Перший строк сієви																																					
Найменування робіт	Одвнм.	Склад апарату				Обслуговуючий персонал				Норма виробітку				Кількість нормовизні		Зарплати праці, млод-год		Оплата праці по тарифу на весь обсяг робіт, грн.		Разом виплат на оплату праці,грн.		Платне		Всього затрат,грн.													
		у фіз.од.	в умов.га	трактори, автомоб.	с.ч.машини	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	механізатори	інші	механізатори	інші	на одобр.	кількість, л	всього	Вартість,всього грн.																		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24															
Пущення стріли в два спливи	га	200	53,9	Т-150К	ДШ-10	1	V	16,33				49	4,1	32,7		3265,6		3265,6	3	600	15720,0	18986															
Передпосівна культивування	га	100	39,7	Т-150К	2ХПС-4	1	V	26,49				30,2	3,3	26,5		2649,3		2649,3	4,5	450	11790,0	14439															
Прогрунтявання насіння	т	22		ПС-10		1	IV	75,01	2	Ш	5,07	8	2,8	16,5	33,0	1650,2	223,1	1873,2	мбл-гол	165	323	2197															
Навантаження насіння і добрив	т	42		ЗП-60		1	V	9,41	2	П	0,56	85	0,5	4,0	7,9		47,3	47,3	мбл-гол	40	77	125															
Транспортування насіння і добрив	т	42		ГАЗ-53		1		7,26				погод.	2,9	22,9		165,9		165,9		50	1310,0	1476															
Сівба з внесенням добрив	га	100	13,7	ХТЗ-170	(серед.плем.набор)	1	V	22,86	1	Ш	1,55	35	2,9	22,9	22,9	2285,9	154,5	2440,5	3,5	350	9170,0	11610															
Примочування посівів	га	100	11,2	МТЗ-80	ЗКШ-6	1	П	16,00				50	2,0	16,0		1600,2		1600,2	1,9	190	4978,0	6578															
Воронування посівів навесні	га	100	26,7	Т-150	СТ-21-ВЗСС-1	1	V	17,78				45	2,2	17,8		1778,0		1778,0	1,5	150	3930,0	5708															
Транспортування добрив	т	9		ГАЗ-53		1		7,26				погод.	2,4	19,0		138,3		138,3		50	1310,0	1448															
Підживлення 1 р.-0,9 ц/га	га	100	13,3	МТЗ-80	МБТ-900	1	IV	19,05				42	2,4	19,0		1905,0		1905,0	1,51	151	3956,2	5861															
Транспортування води і опруток	т	80		ГАЗ-53		1		7,26				погод.	2,0	12,0		87,1		87,1		25	655,0	742															
Внесення гербіцидів та фунгіцидів	га	100	5,1	Ланг	самолет	1	VI	9,56	1	IV	0,67	70	1,4	8,6	11,4	956,4	66,5	1022,9	1,3	130	3406,0	4429															
Транспортування води і опруток	т	160		ГАЗ-53		1		7,26				погод.	1,4	8,6		62,2		62,2		25	655,0	717															
Внесення інсектицидів	га	100	5,1	Ланг	самолет	1	VI	9,56	1	IV	0,67	70	1,4	8,6	11,4	956,4	66,5	1022,9	1,3	130	3406,0	4429															
Збірвання врожаю	га	100		Джон-Дір		2	VI	57,59				15,5	6,5	103,2		11517,9		11517,9	8,3	830	21746,0	33264															
Транспортування зерна	т	504		ГАЗ-53		2		7,26				погод.	6,5	103,2		1498,8		1498,8		378	9903,6	11402															
Очистка зерна	т	504		Петрус		1	V	68,38	4	Ш	4,62	11,7	43,1	344,6	1378	34465,0	9318,4	43883,4	мбл-гол	3446	6754,5	50538															
Разом по культурі			169											786	1465	64982	9876	74859		3509	91956	11402															

Тех.карта 4.

Технологічна карта																										
Культура	Озима пшениця	Норма висіву, кг/га	220	Прогружування, л (Вівасекс - 200##)	55	Урожайність, ц/га		Валовий збір, ц																		
Сорт	Новокиївська	Всього насіння, т	22	Гербіцид, л (Діріна 0,5 л/га)	50																					
Попережник	Осиний ріпак	Система удобрення	№,Д,К,Р,Н,м	інсектицид, л (Фі-38 0,5 л/га)	75	зерна		50,8		5080																
Площа, га	100	Всього туків, т	20	фунгіцид, л (Аліро супер 0,5 л/га)	50																					
Перший строк сієби																										
Найменування робіт	Одиниця	Обсяг робіт		Серед агрегату		Обслуговуваний персонал						Норми виробітку			Зарплати праців. тис.грн			Оплата праці по тварину на вськ обсяг робіт, грн			Разом витрат на оплату праці, грн.			Планне		Всього затрат, грн.
		у фіз.од.	в умов.га	трактори, автомоб.	с.г.т. машини	трактористи-машиністи		робітники ручної праці		Норма виробітку	Кількість нормовизн	Зарплати праців. тис.грн		месанізатори	інші	месанізатори	інші	Разом витрат на оплату праці, грн.	на одроби		Вартість, всього грн.					
						кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість			розряд роботи	Розцінка, грн/га						месанізатори	інші		месанізатори	інші	кількість, л	всього	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
Душення сирого в два сіли	га	200	53,9	Т-150К	ДП-10	1	V	16,33				49	4,1	32,7		3265,6		3265,6	3	600	15720,0	18986				
Передпосівна культивация	га	100	39,7	Т-150К	2КП-4	1	V	26,49				30,2	3,3	26,5		2649,3		2649,3	4,5	450	11790,0	14439				
Прогружування насіння	т	22		ПС-10		1	IV	75,01	2	III	5,07	8	2,8	16,5	33,0	1650,2	223,1	1873,2	487-год	165	323	2197				
Навантаження насіння і добрив	т	42		ЗП-60		1	V	9,41	2	II	0,56	85	0,5	4,0	7,9		47,3	47,3	487-год	40	77	125				
Транспортування насіння і добрив	т	42		ТА-53		1		7,26				погод.	2,9	22,9		165,9		165,9		50	1310,0	1476				
Сівба з внесенням добрив	га	100	13,7	ХТЗ-170	(Great Plains S5000)	1	V	22,86	1	III	1,55	35	2,9	22,9	22,9	2285,9	154,5	2440,5	3,5	350	9170,0	11610				
Примочування посівів	га	100	11,2	ЛПЗ-80	ЗКШ-6	1	II	16,00				50	2,0	16,0		1600,2		1600,2	1,9	190	4978,0	6578				
Воронування посівів навесні	га	100	26,7	Т-150	СТ-21-ВЗСС-1	1	V	17,78				45	2,2	17,8		1778,0		1778,0	1,5	150	3930,0	5708				
Транспортування добрив	т	9		ТА-53		1		7,26				погод.	2,4	19,0		138,3		138,3		50	1310,0	1448				
Підкормлення 1 р - 0,9 ц/га	га	100	13,3	ЛПЗ-80	ЛБД-900	1	IV	19,05				42	2,4	19,0		1905,0		1905,0	1,51	151	3956,2	5861				
Транспортування води і отрутохімікатів	т	80		ТА-53		1		7,26				погод.	2,0	12,0		87,1		87,1		25	655,0	742				
Внесення гербицидів та фунгіцидів	га	100	5,1	Лазер	самосад	1	VI	9,56	1	IV	0,67	70	1,4	8,6	11,4	956,4	66,5	1022,9	1,3	130	3406,0	4429				
Транспортування води і отрутохімікатів	т	160		ТА-53		1		7,26				погод.	1,4	8,6		62,2		62,2		25	655,0	717				
Внесення інсектицидів	га	100	5,1	Лазер	самосад	1	VI	9,56	1	IV	0,67	70	1,4	8,6	11,4	956,4	66,5	1022,9	1,3	130	3406,0	4429				
Збірвання врожаю	га	100		Джон-Дір		2	VI	57,59				15,5	6,5	103,2		11517,9		11517,9	8,3	830	21746,0	33264				
Транспортування зерна	т	533,4		ТА-53		2		7,26				погод.	6,5	103,2		1498,8		1498,8		400	10481,3	11980				
Очистка зерна	т	533,4		Петрус		1	V	68,38	4	III	4,62	11,7	45,6	364,7	1459	36475,4	9862,0	#####	487-год	3647	7148,5	53486				
Разом по культурі			169											806	1545	66993	10420	77413		3531	92514	#####				

Тех.карта 5.

Технологічна карта

Культура	Озима пшениця	Норма висіву, кг/га	220	Протруйник, л (Вітанс - 200##)	55	Урожайність, ц/га		Валовий збір, ц
Сорт	Кубус	Всього насіння, т	22	Гербіцид, л (Пірама 0,5 л/га)	50			
Попередник	Озимий ріпак	Система удобрєння	№,Р,К,с+№м	інсектицид, л (Бі-58 0,75 л/га)	75	зерна		50,8
Площа, га	100	Всього тунів, т	20	фунгіцид, л (Аліро супер 0,5 л/га)	50			5080

Перший строк сієї

Найменування робіт	Одн.в.	Обсяг робіт		Склад агрегату			Обслуговуючий персонал				Норми виробітку				Кількість нормовизн		Затрати праці, люд-год		Оплата праці по тарифу на весь обсяг робіт, грн.		Разом витрат на оплату праці, грн.		Підане			Всього затрат, грн.
		у фіз. од.	в умов. га	трактори, автомоб.	с.т. машини	кількість машиністів	розряд роботи	Розряд, грн/га	кількість працівників	розряд роботи	Розряд, грн/га	Норми виробітку	Кількість нормовизн	механізатори	інші	механізатори	інші	на одроби.	кількість, л	всього	Вартість, всього грн.					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
Плування стери в два сліди	га	200	53,9	Т-150К	ДП-10	1	V	16,33				49	4,1	32,7		3265,6		3265,6	3	600	15720,0	18986				
Передпосівна культивация	га	100	39,7	Т-150К	ДКТС-4	1	V	26,49				30,2	3,3	26,5		2649,3		2649,3	4,5	450	11790,0	14439				
Протруєвання насіння	т	22		ПС-10		1	IV	75,01	2	III	5,07	8	2,8	16,5	33,0	1650,2	223,1	1873,2	кВт-год	165	323	2197				
Навантаження насіння і добрив	т	42		ЗП-60		1	V	9,41	2	II	0,56	85	0,5	4,0	7,9		47,3	47,3	кВт-год	40	77	125				
Транспортування насіння і добрив	т	42		ГАЗ-53		1		7,26				погод	2,9	22,9		165,9		165,9		50	1310,0	1476				
Сівба з внесенням добрив	га	100	13,7	ХТЗ-170	Great Plains 354000	1	V	22,86	1	III	1,55	35	2,9	22,9	22,9	2285,9	154,5	2440,5	3,5	350	9170,0	11610				
Примовування посівів	га	100	11,2	МТЗ-80	ЗКШ-6	1	II	16,00				50	2,0	16,0		1600,2		1600,2	1,9	190	4978,0	6578				
Воронування посівів навесні	га	100	26,7	Т-150	СТ-21+ВСС-1	1	V	17,78				45	2,2	17,8		1778,0		1778,0	1,5	150	3930,0	5708				
Транспортування добрив	т	9		ГАЗ-53		1		7,26				погод	2,4	19,0		138,3		138,3		50	1310,0	1448				
Підкормлення 1 р. - 0,9 ц/га	га	100	13,3	МТЗ-80	МВД-900	1	IV	19,05				42	2,4	19,0		1905,0		1905,0	1,51	151	3956,2	5861				
Транспортування води і отрутохімікатів	т	80		ГАЗ-53		1		7,26				погод	2,0	12,0		87,1		87,1		25	655,0	742				
Внесення гербицидів та фунгіцидів	га	100	5,1	Ланг	самоход	1	VI	9,56	1	IV	0,67	70	1,4	8,6	11,4	956,4	66,5	1022,9	1,3	130	3406,0	4429				
отрутохімікатів	т	160		ГАЗ-53		1		7,26				погод	1,4	8,6		62,2		62,2		25	655,0	717				
Внесення інсектицидів	га	100	5,1	Ланг	самоход	1	VI	9,56	1	IV	0,67	70	1,4	8,6	11,4	956,4	66,5	1022,9	1,3	130	3406,0	4429				
Збірвання врожаю	га	100		Джон-Дір		2	VI	57,59				15,5	6,5	103,2		11517,9		11517,9	8,3	830	21746,0	33264				
Транспортування зерна	т	533,4		ГАЗ-53		2		7,26				погод	6,5	103,2		1498,8		1498,8		400	10481,3	11980				
Очистка зерна	т	533,4		Петрус		1	V	68,38	4	III	4,62	11,7	45,6	364,7	1459	36475,4	9862,0	#####	кВт-год	3647	7148,5	53486				
Разом по культурі			169										806	1545	66993	10420	77413		3531	92514	#####					

Тех.карта 6.

Технологічна карта

Культура	Озима пшениця	Норма висіву, кг/га	220	Протруйники, л (Вітавік - 200г/г)	55	Урожайність, ц/га		Варовий збір, ц
Сорт	Балетка	Всього насіння, т	22	Гербіциди, л (Лірига 0,5 л/га)	50			
Попередник	Озимий ріпак	Система удобрення	N ₁₂₀ P ₆₀ K ₆₀ +N ₃₀	інсектициди, л (Бі-58 0,75 л/га)	75	зерна		51,3
Площа, га	100	Всього гудів, т	20	фунгіциди, л (Аліро супер 0,5 л/га)	50			5130

Перший строк сієї

Найменування робіт	Одн.в.	Обсяг робіт		Сила агрегату		Обслуговувочий персонал						Норма виробітку			Кількість нормозмін		Заграти праці, площ-год		Оплата праці по тарифу на весь обсяг робіт, грн.		Разом витрат на оплату праці, грн.		Планне		Всього затрат, грн.		
		у фіз. од.	в умов.га	трактори, автомоб.	с.т.машини	кількість	розряд роботи	Розрядна, грн/га	кількість	розряд роботи	Розрядна, грн/га	кількість	розряд роботи	Розрядна, грн/га	кількість	розряд роботи	кількість	розряд роботи	кількість	розряд роботи	кількість	розряд роботи	кількість	розряд роботи		кількість	розряд роботи
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
Пущення стріли в два сіїли	га	200	53,9	T-150K	ДП-10	1	V	16,33				49	4,1	32,7		3265,6		3265,6	3	600	15720,0	18986					
Перашпосна культивация	га	100	39,7	T-150K	2KTC-4	1	V	26,49				30,2	3,3	26,5		2649,3		2649,3	4,5	450	11790,0	14439					
Протруєвання насіння	т	22		ПС-10		1	IV	75,01	2	III	5,07	8	2,8	16,5	33,0	1650,2	223,1	1873,2	кВт-год	165	323	2197					
Навантаження насіння і добрив	т	42		ЗП-60		1	V	9,41	2	II	0,56	85	0,5	4,0	7,9		47,3	47,3	кВт-год	40	77	125					
Транспортування насіння і добрив	т	42		ГАЗ-53		1		7,26				погод.	2,9	22,9		165,9		165,9		50	1310,0	1476					
Сівба з внесенням добрив	га	100	13,7	ХТЗ-170	(серед. Плато 184000)	1	V	22,86	1	III	1,55	35	2,9	22,9	22,9	2285,9	154,5	2440,5	3,5	350	9170,0	11610					
Примочування посівів	га	100	11,2	МТЗ-80	ЗКСШ-6	1	II	16,00				50	2,0	16,0		1600,2		1600,2	1,9	190	4978,0	6578					
Воронування посівів насінні	га	100	26,7	T-150	СТ-21-ВЗС-1	1	V	17,78				45	2,2	17,8		1778,0		1778,0	1,5	150	3930,0	5708					
Транспортування добрив	т	9		ГАЗ-53		1		7,26				погод.	2,4	19,0		138,3		138,3		50	1310,0	1448					
Підживлення 1 р. - 0,9 ц/га	га	100	13,3	МТЗ-80	МВД-900	1	IV	19,05				42	2,4	19,0		1905,0		1905,0	1,51	151	3956,2	5861					
Транспортування води і опрутокликів	т	80		ГАЗ-53		1		7,26				погод.	2,0	12,0		87,1		87,1		25	655,0	742					
Внесення гербіцидів та фунгіцидів	га	100	5,1	Ланг	самолет	1	VI	9,56	1	IV	0,67	70	1,4	8,6	11,4	956,4	66,5	1022,9	1,3	130	3406,0	4429					
Транспортування води і опрутокликів	т	160		ГАЗ-53		1		7,26				погод.	1,4	8,6		62,2		62,2		25	655,0	717					
Внесення інсектицидів	га	100	5,1	Ланг	самолет	1	VI	9,56	1	IV	0,67	70	1,4	8,6	11,4	956,4	66,5	1022,9	1,3	130	3406,0	4429					
Збірвання врожаю	га	100		Джон-Дір		2	VI	57,59				15,5	6,5	103,2		11517,9		11517,9		830	21746,0	33264					
Транспортування зерна	т	538,7		ГАЗ-53		2		7,26				погод.	6,5	103,2		1498,8		1498,8		404	10584,5	12083					
Очистка зерна	т	538,7		Петрус		1	V	68,38	4	III	4,62	11,7	46,0	368,3	1473	36834,5	9959,0	#####	кВт-год	3683	7218,8	54012					
Разом по культурі			169											810	1560	67352	10517	77869		3335	92617	#####					

Тех.карта 7.

Технологічна карта																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Культура	Озима пшениця	Норма висіву, кг/га	220	Продуктивність, л (Вітажес - 200#)										55	Урожайність, ц/га				Валовий збір, ц																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Сорт	Скаген	Всього насіння, т	22	Тербища, л (Піріна 0,5 л/га)										50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Попередник	Осиний ріпак	Система удобрення	М.Р.К.ч. N ₃₀	інсектициди, л (Бі-38 0,5 л/га)										75	зерна				50,9	5090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Площа, га	100	Всього гудів, т	20	9	фунгіциди, л (Амбро супер 0,5 л/га)										50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Перший строк сієви																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Найменування робіт	Одн.в.	Обсяг робіт:			Склад агрегату								Обслуговуючий персонал						Норма виробітку				Кількість нормозмін		Затрати праці, люд-год		Оплата праці по тарифу на весь обсяг робіт, грн.		Разом витрат на оплату праці, грн.		Платня		Всього затрат, грн.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		у фіз. од.	в умов. га	трактори, автомоб.	сіль. машини	кількість	розряд	Розцінов, грн/га	кількість	розряд	Розцінов, грн/га	кількість	розряд	Розцінов, грн/га	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд		кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд	кількість	розряд

Тех.карта 8.

Технологічна карта																							
Культура	Орнза пшениця	Норма висіву, кг/га	220	Прогрунтя, л (Віванс- 200#)	55	Урожайність, ц/га		Валовий збір, ц															
Сорт	Даринка Київська	Всього насіння, т	22	Гербіцид, л (Діюла 0,5 л/га)	50																		
Попередник	Озимий ріпак	Система удобрення	N ₂ P ₄ K ₂ +N ₃₀	інсектицид, л (Бі-38 0,75 л/га)	75	зерна		52,9	5290														
Площа, га	100	Всього тунів, т	20	фунгіцид, л (Алато супер 0,5 л/га)	50																		
Перший строк сіви																							
Найменування робіт	Обсяг робіт	Серед апарату			Обслуговуючий персонал				Норма виробітку	Кількість нормозмін		Заграти праці, млод-год		Оплата праці по тарифу на весь обсяг робіт, грн.		Разом витрат на оплату праці, грн.		Підпис			Всього затрат, грн.		
		у фіз. од.	в умов.га	трактори, автомоб.	машини	кількість	розряд роботи	робітники ручної праці		кількість	розряд роботи	Розцінов, грн/га	механізатори	напі	механізатори	напі	на одроб.	кількість, л	всього	Вартість, всього грн.			
								Розцінов, грн/га														Розцінов, грн/га	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Душення стери в два стіли	га	200	53,9	Т-150К	ДП-10	1	V	16,33				49	4,1	32,7		3265,6		3265,6	3	600	15720,0	18986	
Підприємства культивація	га	100	39,7	Т-150К	2ХПС-4	1	V	26,49				30,2	3,3	26,5		2649,3		2649,3	4,5	450	11790,0	14439	
Прогрунтя насіння	т	22		ПС-10		1	IV	75,01	2	III	5,07	8	2,8	16,5	33,0	1650,2	223,1	1873,2	кВт-год	165	323	2197	
Навантаження насіння і доборя	т	42		ЗП-60		1	V	9,41	2	II	0,56	85	0,5	4,0	7,9		47,3	47,3	кВт-год	40	77	125	
Транспортування насіння і доборя	т	42		ГАЗ-53		1		7,26				потод.	2,9	22,9		165,9		165,9		50	1310,0	1476	
Сівба з внесенням добрив	га	100	13,7	ХПЗ-170	(Great Plan, N4000)	1	V	22,86	1	III	1,55	35	2,9	22,9	2285,9	154,5	2440,5	3,5	350	9170,0	11610		
Примочування посівів	га	100	11,2	МТЗ-80	ЗКШ-6	1	II	16,00				50	2,0	16,0		1600,2		1600,2	1,9	190	4978,0	6578	
Ворочування посівів навесні	га	100	26,7	Т-150	СТ-21-ВЗСС-1	1	V	17,78				45	2,2	17,8		1778,0		1778,0	1,5	150	3930,0	5708	
Транспортування добрив	т	9		ГАЗ-53		1		7,26				потод.	2,4	19,0		138,3		138,3		50	1310,0	1448	
Підживлення 1 р- 0,9 л/га	га	100	13,3	МТЗ-80	МБД-200	1	IV	19,05				42	2,4	19,0		1905,0		1905,0	1,51	151	3956,2	5861	
Транспортування води і отрутохімікатів	т	80		ГАЗ-53		1		7,26				потод.	2,0	12,0		87,1		87,1		25	655,0	742	
Внесення гербіцидів та фунгіцидів	га	100	5,1	Лазет	самоход.	1	VI	9,56	1	IV	0,67	70	1,4	8,6	11,4	956,4	66,5	1022,9	1,3	130	3406,0	4429	
Транспортування води і отрутохімікатів	т	160		ГАЗ-53		1		7,26				потод.	1,4	8,6		62,2		62,2		25	655,0	717	
Внесення інсектицидів	га	100	5,1	Лазет	самоход.	1	VI	9,56	1	IV	0,67	70	1,4	8,6	11,4	956,4	66,5	1022,9	1,3	130	3406,0	4429	
Звернення врожаю	га	100		Джон-Дір		2	VI	57,59				15,5	6,5	103,2		11517,9		#####	8,3	830	21746,0	33264	
Транспортування зерна	т	555,5		ГАЗ-53		2		7,26				потод.	6,5	103,2		1498,8		1498,8		417	10914,6	12413	
Очистка зерна	т	555,5		Пелюс		1	V	68,38	4	III	4,62	11,7	47,5	379,8	1519	37983,3	#####	#####	кВт-год	3798	7444	55697	
Разом по культурі		169											821	1606	68501	10828	79328		3548	92947	#####		

Технологічні карти після попередника соя

Тех.карта 1.

Технологічна карта																								
Культура	Орiza пшениця	Норма висіву, кг/га	220	Протруєння, л (Віванк - 200#ф)	55	Урожайність, ц/га		Валовий збір, ц																
Сорт	Подольська	Всього насіння, т	22	Гербіцид, л (Пріма 0,5 л/га)	50																			
Попередник	соя	Система удобрення	N-Р-К-с+ N-с	інсектицид, л (Бі-58 0,75 л/га)	75	зерна		41,2																
Площа, га	100	Всього тунів, т	20	фунгіцид, л (Амго супер 0,5 л/га) <td>50</td> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th>	50																			
Перший строк сівби																								
Найменування робіт	Одним.	Обсяг робіт		Склад апарату		Обслуговуючий персонал				Норма виробітку		Кількість нормовміст		Заграти праці, люд-год		Оплата праці по тарифу на весь обсяг робіт, грн		Разом витрат на оплату праці, грн.		Підкове		Всього затрат, грн.		
		у фіз.од.	в умов.га	трактори, автомоб.	с.т.машини	кількість	тракторист-машиніст	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	механізатори	інші	механізатори	інші	на одроби	кількість, л		всього	Вартість, всього грн.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
Душення ґрунту в два стріли	га	200	53,9	Т-150К	ДШ-10	1	V	16,33				49	4,1	32,7		3265,6		3265,6	3	600	15720,0	18986		
Передпосівна культиваци́я	га	100	39,7	Т-150К	2ХПС-4	1	V	26,49				30,2	3,3	26,5		2649,3		2649,3	4,5	450	11790,0	14439		
Протруєвання насіння	т	22		ПС-10		1	IV	75,01	2	III	5,07	8	2,8	16,5	33,0	1650,2	223,1	1873,2	1873,2	165	323	2197		
Навантаження насіння і добрив	т	42		ЗП-60		1	V	9,41	2	II	0,56	85	0,5	4,0	7,9		47,3	47,3	1873,2	40	77	125		
Транспортування насіння і добрив	т	42		ГАЗ-53		1		7,26				поток	2,9	22,9		165,9		165,9		50	1310,0	1476		
Сівба з внесеним добрив	га	100	13,7	ХТЗ-170	Севол Пилос-38000	1	V	22,86	1	III	1,55	35	2,9	22,9	22,9	2285,9	154,5	2440,5	3,5	350	9170,0	11610		
Примочування посівів	га	100	11,2	АПЗ-80	ЗКШ-6	1	II	16,00				50	2,0	16,0		1600,2		1600,2	1,9	190	4978,0	6578		
Воронування посівів навесні	га	100	26,7	Т-150	СТ-21+БКС-1	1	V	17,78				45	2,2	17,8		1778,0		1778,0	1,5	150	3930,0	5708		
Транспортування добрив	т	9		ГАЗ-53		1		7,26				поток	2,4	19,0		138,3		138,3		50	1310,0	1448		
Підживлення 1 р.-0,9 ц/га	га	100	13,3	АПЗ-80	АПД-900	1	IV	19,05				42	2,4	19,0		1905,0		1905,0	1,51	151	3956,2	5861		
Транспортування води і отрутохімікатів	т	80		ГАЗ-53		1		7,26				поток	2,0	12,0		87,1		87,1		25	655,0	742		
Внесення гербіцидів та фунгіцидів	га	100	5,1	Лавей	самолет	1	VI	9,56	1	IV	0,67	70	1,4	8,6	11,4	956,4	66,5	1022,9	1,3	130	3406,0	4429		
Транспортування води і отрутохімікатів	т	160		ГАЗ-53		1		7,26				поток	1,4	8,6		62,2		62,2		25	655,0	717		
Внесення інсектицидів	га	100	5,1	Лавей	самолет	1	VI	9,56	1	IV	0,67	70	1,4	8,6	11,4	956,4	66,5	1022,9	1,3	130	3406,0	4429		
Збирання врожаю	га	100		Джон-Дір		2	VI	57,59				15,5	6,5	109,2		11517,9		11517,9		830	21746,0	33264		
Транспортування зерна	т	432,6		ГАЗ-53		2		7,26				поток	6,5	103,2		1498,8		1498,8		324	8500,6	9999		
Очистка зерна	т	432,6		Петрус		1	V	68,38	4	III	4,62	11,7	37,0	295,8	1183	29582,4	7998,3	37580,7		2958	5797,6	43378		
Разом по культурі			169											737	1270	60100	8556	68656		3455	90533	111111		

Тех.карта 2.

Технологічна карта																						
Культура	Озима пшениця	Норма висіву, кг/га	220	Прогрунтова, л (Вітажес - 200**)	55	Урожайність, ц/га		Валовий збір, ц														
Сорт	Фаворитка	Всього насіння, т	22	Гребіща, л (Гребіш 0,5 л/га)	50																	
Попередник	соя	Система удобрення	№, в.к.м. + №	інкапсуляція, л (Ві-58 0,75 л/га)	75	зерна		42,9														
Площа, га	100	Всього тунів, т	20	фунгіцид, л (Аліро супер 0,5 л/га)	50																	
Перший строк сіви																						
Найменування робіт	Одн. вим.	Обсяг робіт	Склад апарату			Обслуговуючий персонал			Норми виробітку	Кількість нормованих	Зарплата праців. за год-роб.		Оплата праці по тарифу на весь обсяг робіт, грн.		Разом витрати на оплату праці, грн.		Підприємство		Всього затрат, грн.			
			трактори, автомобілі	с.г. машини	кількість машини	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість праців. ручної праці			Розцінка, грн/га	Норми виробітку	Кількість нормованих	механізатори	інші	механізатори	інші	Разом витрати на оплату праці, грн.		Підприємство		
																				кількість, л	всього	Вартість, всього грн.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Душення стріли в два сіли	га	200	53,9	Т-150К	ДП-10	1	V	16,33				49	4,1	32,7		3265,6		3265,6	3	600	15720,0	18986
Препарування посівів	га	100	39,7	Т-150К	ДП-4	1	V	26,49				30,2	3,3	26,5		2649,3		2649,3	4,5	450	11790,0	14439
Прогрунтова насіння	т	22		ПС-10		1	IV	75,01	2	III	5,07	8	2,8	16,5	33,0	1650,2	223,1	1873,2	кВт-год	165	323	2197
Навантаження насіння і добрив	т	42		ЗП-60		1	V	9,41	2	II	0,56	85	0,5	4,0	7,9		47,3	47,3	кВт-год	40	77	125
Транспортування насіння і добрив	т	42		ГАЗ-53		1		7,26				погод	2,9	22,9		165,9		165,9		50	1310,0	1476
Сівба з висівним добривом	га	100	13,7	ХПЗ-170	(серед. Паша-84000)	1	V	22,86	1	III	1,55	35	2,9	22,9	22,9	2285,9	154,5	2440,5	3,5	350	9170,0	11610
Примочування посівів	га	100	11,2	ДПЗ-80	ЗКШ-6	1	II	16,00				50	2,0	16,0		1600,2		1600,2	1,9	190	4978,0	6578
Воронування посівів навесні	га	100	26,7	Т-150	СТ-21-ВЗСС-1	1	V	17,78				45	2,2	17,8		1778,0		1778,0	1,5	150	3930,0	5708
Транспортування добрив	т	9		ГАЗ-53		1		7,26				погод	2,4	19,0		138,3		138,3		50	1310,0	1448
Підняття і р-0,9 ц/га	га	100	13,3	ДПЗ-80	ДВЛ-900	1	IV	19,05				42	2,4	19,0		1905,0		1905,0	1,51	151	3956,2	5861
Транспортування води і отрутохімікатів	т	80		ГАЗ-53		1		7,26				погод	2,0	12,0		87,1		87,1		25	653,0	742
Внесення гербіцидів та фунгіцидів	га	100	5,1	Лавел	самолет	1	VI	9,56	1	IV	0,67	70	1,4	8,6	11,4	956,4	66,5	1022,9	1,3	130	3406,0	4429
Транспортування води і отрутохімікатів	т	160		ГАЗ-53		1		7,26				погод	1,4	8,6		62,2		62,2		25	653,0	717
Внесення інсектицидів	га	100	5,1	Лавел	самолет	1	VI	9,56	1	IV	0,67	70	1,4	8,6	11,4	956,4	66,5	1022,9	1,3	130	3406,0	4429
Зерняна врожай	га	100		Джон-Дір		2	VI	57,59				15,5	6,5	103,2		11517,9		11517,9	8,3	830	21746,0	33264
Транспортування зерна	т	450,5		ГАЗ-53		2		7,26				погод	6,5	103,2		1498,8		1498,8		338	881,3	10350
Очистка зерна	т	450,5		Петрус		1	V	68,38	4	III	4,62	11,7	38,5	308,0	1232	30803,1	8328,3	39131,4	кВт-год	3080	6036,8	45168
Разом по культурі		169											749	1319	61320	8886	70207			3469	90884	111111

Тех.карта 3.

Технологічна карта

Культура	Орнза пшениця	Норми висіву, кг/га	220	Пророщування, л (Візанк - 200г/ф)	55	Урожайність, ц/га		Валовий збір, ц
Сорт	Золотоколос	Всього насіння, т	22	Тербища, л (Пірна 0,5 л/га)	50			
Поперединик	соя	Система утрощення	№,Р,К,І+№	інкаспіш, л (В-38 0,75 л/га)	75	зерна		4700
Площа, га	100	Всього тунів, т	20	фунгіцид, л (Альо сугер 0,5 л/га)	50			

Перший строк сієї

Найменування робіт	Одн. вим.	Обсяг робіт	Сила агрегату	Обслуговуваний персонал						Норма виробітку	Кількість нормових годин	Затрати праці, люд.-год		Оплата праці по тарифу на весел обсяг робіт, грн.		Разом затрат на оплату праці, грн.	Планне		Всього затрат, грн.				
				у фіз. од.	в умов. га	тракторист, автомоб.	с. т. машин	трактористи-машиністи				робітники ручної праці		механізатори	інші		механізатори	інші		на одобр.	кількість, л	всього	Вартість, всього грн.
								розряд роботи	Розціновка, грн/га			розряд роботи	Розціновка, грн/га										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Душення стріли з лав сієли	га	200	53,9	Т-150К	ДПР-10	1	V	16,33				49	4,1	32,7		3265,6		3265,6	3	600	15700,0	18986	
Передпосівна культивання	га	100	39,7	Т-150К	2МПС-4	1	V	26,49				30,2	3,3	26,5		2649,3		2649,3	4,5	450	11790,0	14439	
Проробування насіння	т	22		ПС-10		1	IV	75,01	2	III	5,07	8	2,8	16,5	33,0	1650,2	223,1	1873,2	КС-топ	165	323	2197	
Навішанення насіння і добрив	т	42		ЗП-60		1	V	9,41	2	II	0,56	85	0,5	4,0	7,9		47,3	47,3	КС-топ	40	77	125	
Транспортування насіння і добрив	т	42		ТАЗ-53		1		7,26				поток	2,9	22,9		165,9		165,9		50	1310,0	1476	
Сівка з висівним добривом	га	100	13,7	ХТЗ-170	Green Hawk 384000	1	V	22,86	1	III	1,55	35	2,9	22,9	22,9	2285,9	154,5	2440,5	3,5	350	9170,0	11610	
Примочування посівів	га	100	11,2	МТЗ-80	ЗКШ-6	1	II	16,00				50	2,0	16,0		1600,2		1600,2	1,9	190	4978,0	6578	
Воронування посівів навесні	га	100	26,7	Т-150	СТ-21+БЗСС-1	1	V	17,78				45	2,2	17,8		1778,0		1778,0	1,5	150	3950,0	5708	
Транспортування добрив	т	9		ТАЗ-53		1		7,26				поток	2,4	19,0		138,3		138,3		50	1310,0	1448	
Підкормлення і р-0,9 ц/га	га	100	13,3	МТЗ-80	МБД-900	1	IV	19,05				42	2,4	19,0		1905,0		1905,0	1,51	151	3956,2	5861	
Транспортування води і органоїнів	т	80		ТАЗ-53		1		7,26				поток	2,0	12,0		87,1		87,1		25	655,0	742	
Внесення гербицидів та фунгіцидів	га	100	5,1	Лазер	самостоп	1	VI	9,56	1	IV	0,67	70	1,4	8,6	11,4	956,4	66,5	1022,9	1,3	130	3406,0	4429	
Транспортування води і органоїнів	т	160		ТАЗ-53		1		7,26				поток	1,4	8,6		62,2		62,2		25	655,0	717	
Внесення інсектицидів	га	100	5,1	Лазер	самостоп	1	VI	9,56	1	IV	0,67	70	1,4	8,6	11,4	956,4	66,5	1022,9	1,3	130	3406,0	4429	
Збирання врожаю	га	100		Джон-Дір		2	VI	57,59				15,5	6,5	103,2		11517,9		11517,9	8,3	830	21746,0	33264	
Транспортування зерна	т	493,5		ТАЗ-53		2		7,26				поток	6,5	103,2		1498,8		1498,8		370	9697,3	11196	
Очистка зерна	т	493,5		Патус		1	V	68,38	4	III	4,62	11,7	42,2	337,4	1350	33747,0	9124,3	42871,3	КС-топ	3374	6613,7	49483	
Разом по культурі		169												779	1436	64264	9682	73946		3501	91729	111111	

Технологічна карта																							
Культура	Орніа пшениця	Норма висіву, кг/га	220	Проробники, л (Вітажак - 200#)	55	Урожайність, ц/га		Валовий збір, ц															
Сорт	Новокиївська	Всього насіння, т	22	Гербіцид, л (Пірама 0,5 л/га)	50																		
Попередник	сок	Система удобрення	№Р,К,с+№в	інсектицид, л (Ві-58 0,5 л/га)	75	зерна		46,2															
Площа, га	100	Всього туків, т	20	фунгіцид, л (Аліго супер 0,5 л/га)	50																		
Перший строк сїви																							
Найменування робіт	Одним.	Обсяг робіт		Склад агрегату		Обслуговувочий персонал				Норми виробітку		Кількість нормозмін		Зарплати праці,		Оплата праці по тарифу на весь обсяг робіт, грн.		Разом витрат на оплату праці, грн.		Підліне		Всього затрат, грн.	
														тис. грн.									
		у фіз. од.	в умов. га	трактори, автомоб.	с.ч. машин	кількість трактористів-машиністів	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість робітників ручної праці	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість меканізатори	інші	кількість меканізатори	інші	на одроб.	кількість, л	всього	Вартість, всього грн.				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Друшення сторін в два сідін	га	200	53,9	Т-150К	ДЩ-10	1	V	16,33				49	4,1	32,7		3265,6		3265,6	3	600	15720,0	18986	
Прєдпосївна культивація	га	100	39,7	Т-150К	2КШС-4	1	V	26,49				30,2	3,3	26,5		2649,3		2649,3	4,5	450	11790,0	14439	
Проробування насїння	т	22		ЩС-10		1	IV	75,01	2	III	5,07	8	2,8	16,5	33,0	1650,2	223,1	1873,2	кВт-год	165	323	2197	
Навантаження насїння і добрив	т	42		ЩП-60		1	V	9,41	2	II	0,56	85	0,5	4,0	7,9		47,3	47,3	кВт-год	40	77	125	
Транспортування насїння і добрив	т	42		ГАЗ-53		1		7,26				потр.	2,9	22,9		165,9		165,9		50	1310,0	1476	
Сївка з внесенням добрив	га	100	13,7	ХТЗ-170	(Genet Planes 154000)	1	V	22,86	1	III	1,55	35	2,9	22,9	22,9	2285,9	154,5	2440,5	3,5	350	9170,0	11610	
Примочування посївів	га	100	11,2	ЛМТЗ-80	ЗКШ-6	1	II	16,00				50	2,0	16,0		1600,2		1600,2	1,9	190	4978,0	6578	
Воронування посївів навесні	га	100	26,7	Т-150	СТ-21+ВЗСС-1	1	V	17,78				45	2,2	17,8		1778,0		1778,0	1,5	150	3930,0	5708	
Транспортування добрив	т	9		ГАЗ-53		1		7,26				потр.	2,4	19,0		138,3		138,3		50	1310,0	1448	
Піллявання 1 р-0,9 ц/га	га	100	13,3	ЛМТЗ-80	МВТ-900	1	IV	19,05				42	2,4	19,0		1905,0		1905,0	1,51	151	3956,2	5861	
Транспортування води і отрутохімікатів	т	80		ГАЗ-53		1		7,26				потр.	2,0	12,0		87,1		87,1		25	655,0	742	
Внесення гербіцидів та фунгіцидів	га	100	5,1	Ланер	самоход	1	VI	9,56	1	IV	0,67	70	1,4	8,6	11,4	956,4	66,5	1022,9	1,3	130	3406,0	4429	
Транспортування води і отрутохімікатів	т	160		ГАЗ-53		1		7,26				потр.	1,4	8,6		62,2		62,2		25	655,0	717	
Внесення інсектицидів	га	100	5,1	Ланер	самоход	1	VI	9,56	1	IV	0,67	70	1,4	8,6	11,4	956,4	66,5	1022,9	1,3	130	3406,0	4429	
Збірвання врожаєм	га	100		Джон-Дир		2	VI	57,59				15,5	6,5	103,2		11517,9		#####	8,3	830	21746,0	33264	
Транспортування зерна	т	485,1		ГАЗ-53		2		7,26				потр.	6,5	103,2		1498,8		1498,8		364	9532,2	11031	
Очистка зерна	т	485,1		Петрус		1	V	68,38	4	III	4,62	11,7	41,5	331,7	1327	33172,5	8969,0	#####	кВт-год	3317	6501,2	48643	
Разом по культурі			169											773	1413	63690	9527	73217		3495	91564	#####	

Тех.карта 5.

Технологічна карта																									
Культура	Озима пшениця	Норма висіву, кг/га	220	Прогнозні дані (Вказівка -200#)#										55	Урожайність, ц/га				Валовий збір, ц						
Сорт	Кубус	Висівна норма, т	22	Гербіцид п (Пріма 0,5 л/га)										50											
Потереєлик	соя	Система удобрення	№Р-К-г-№	інсектициди л (В-58 0,75 л/га)										75	зерна				42,9						
Площа, га	100	Всього гект., т	20	9	фунгіцид л (Алато супер 0,5 л/га)										50										
Перший строк сіви																									
Найменування робіт	Одн.в.	Обсяг робіт	у фіз. од.	в умов. га	трактори, автомоб.	с.т. машини	Обслуговуючий персонал						Зарплата праці, мпо-год				Оплата праці по тарифу на весь обсяг робіт, грн.				Платня				Всього затрат, грн.
							кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	Норма виробітку	Кількість нормованих	механізатори	інші	механізатори	інші	Разом витрат на оплату праці, грн.	на одроб.		Вартість, всього грн.			
																				кількість, л	всього				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
Душення ґрунту в два строки	га	200	53,9	Т-150К	ДД-10	1	V	16,33					49	4,1	32,7		3265,6		3265,6	3	600	15720,0	18986		
Передпосівна культивация	га	100	39,7	Т-150К	2ХПС-4	1	V	26,49					30,2	3,3	26,5		2649,3		2649,3	4,5	450	11790,0	14439		
Прогнозування насіння	т	22		ПС-10		1	IV	75,01	2	Ш	5,07		8	2,8	16,5	33,0	1650,2	223,1	1873,2	МВт-год	165	323	2197		
Навантаження насіння і добрива	т	42		ЗП-60		1	V	9,41	2	Ш	0,56		85	0,5	4,0	7,9		47,3	47,3	МВт-год	40	77	125		
Транспортування насіння і добрива	т	42		ГАЗ-53		1		7,26				потра.	2,9	22,9		165,9		165,9		50	1310,0	1476			
Сівба з висівним добривом	га	100	13,7	ХТЗ-170	(Genial Plus 35000)	1	V	22,86	1	Ш	1,55		35	2,9	22,9	22,9	2285,9	154,5	2440,5	3,5	350	9170,0	11610		
Примішування посівів	га	100	11,2	МТЗ-80	ЗКШ-6	1	II	16,00					50	2,0	16,0		1600,2		1600,2	1,9	190	4978,0	6578		
Воронування посівів навесні	га	100	26,7	Т-150	СТ-21+ВСС-1	1	V	17,78					45	2,2	17,8		1778,0		1778,0	1,5	150	3930,0	5708		
Транспортування добрива	т	9		ГАЗ-53		1		7,26				потра.	2,4	19,0		138,3		138,3		50	1310,0	1448			
Підкормлення 1 р.-0,2 ц/га	га	100	13,3	МТЗ-80	МБД-900	1	IV	19,05					42	2,4	19,0		1905,0		1905,0	1,51	151	3956,2	5861		
Транспортування води і отрутохімікатів	т	80		ГАЗ-53		1		7,26				потра.	2,0	12,0		87,1		87,1		25	655,0	742			
Внесення гербіцидів та фунгіцидів отрутохімікатів	га	100	5,1	Лавит	самосход	1	VI	9,56	1	IV	0,67		70	1,4	8,6	11,4	956,4	66,5	1022,9	1,3	130	3406,0	4429		
Транспортування води і отрутохімікатів	т	160		ГАЗ-53		1		7,26				потра.	1,4	8,6		62,2		62,2		25	655,0	717			
Внесення інсектицидів	га	100	5,1	Лавит	самосход	1	VI	9,56	1	IV	0,67		70	1,4	8,6	11,4	956,4	66,5	1022,9	1,3	130	3406,0	4429		
Збирання врожаю	га	100		Джон-Дір		2	VI	57,59					15,5	6,5	103,2		11517,9		11517,9		830	21746,0	33264		
Транспортування зерна	т	450,5		ГАЗ-53		2		7,26				потра.	6,5	103,2		1498,8		1498,8		338	8351,3	10350			
Очистка зерна	т	450,5		Пелюс		1	V	68,38	4	Ш	4,62		11,7	38,5	308,0	1232	30803,1	8328,3	39131,4	МВт-год	3080	6036,8	45168		
Разом по культурі		169												749	1319	61320	8886	70207		3469	90884	111111			

Тех.карта 6.

Технологічна карта																									
Культура	Орми пшениця	Норма висіву, кг/га	220	Прогрунник, л (Вітавік - 200 #)										55	Урожайність, ц/га					Вановий збір, ц					
Сорт	Валетка	Всього насіння, т	22	Тербица, л (Піра 0,5 л/га)										50											
Попередник	соя	Система удобрення	№Р,К,а+№м	інсектициди, л (Ві-58 0,75 л/га)										75	зерна					42,3					
Площа, га	100	Всього туків, т	20	9	фунгіциди, л (Алато супер 0,5 л/га)										50										
Перший строк сіви																									
Найменування робіт	Одним	Обсяг робіт		Сила агрегату			Обслуговувачий персонал						Норма виробітку		Кількість нормовизн		Затрати праці, люд-год		Оплата праці по тарифу на весь обсяг робіт, грн.		Разом витрат на оплату праці, грн.		Планне		Всього затрат, грн.
		у фіз. од.	в умов. га	трактори, автомоб.	с.г. машини	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	механізатори	інші	механізатори	інші	на одробр.	кількість, л	всього	Вартість, всього грн.						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
Душення стерні в два сіли	га	200	53,9	Т-150К	ДПР-10	1	V	16,53				49	4,1	32,7		3265,6		3265,6	3	600	15720,0	18986			
Передпосівна культивация	га	100	39,7	Т-150К	2МПС-4	1	V	26,49				30,2	3,3	26,5		2649,2		2649,2	4,5	450	11790,0	14439			
Прогрунвання насіння	т	22		ПС-10		1	IV	75,01	2	III	5,07	8	2,8	16,5	33,0	1650,2	223,1	1873,2	МБГ-тод	165	323	2197			
Навантаження насіння і добрив	т	42		ЗП-60		1	V	9,41	2	II	0,56	85	0,5	4,0	7,9		47,2	47,2	МБГ-тод	40	77	125			
Транспортування насіння і добрив	т	42		ГАЗ-53		1		7,26				погод.	2,9	22,9		165,9		165,9		50	1310,0	1476			
Сівба з внесенням добрив	га	100	13,7	ХТЗ-170	(Сила План 150000)	1	V	22,86	1	III	1,55	35	2,9	22,9	22,9	2285,9	154,5	2440,5	3,5	350	9170,0	11610			
Примочування посівів	га	100	11,2	МГЗ-80	ЗКШ-6	1	II	16,00				50	2,0	16,0		1600,2		1600,2	1,9	190	4978,0	6578			
Воронування посівів навісні	га	100	26,7	Т-150	СТ-21-ВЗС-1	1	V	17,78				45	2,2	17,8		1778,0		1778,0	1,5	150	3930,0	5708			
Транспортування добрив	т	9		ГАЗ-53		1		7,26				погод.	2,4	19,0		138,3		138,3		50	1310,0	1448			
Підживлення 1 р. - 0,9 ц/га	га	100	13,2	МГЗ-80	МБД-900	1	IV	19,05				42	2,4	19,0		1905,0		1905,0	1,51	151	3956,2	5861			
Транспортування води і оргунолії	т	80		ГАЗ-53		1		7,26				погод.	2,0	12,0		87,1		87,1		25	655,0	742			
Внесення гербицидів та фунгіцидів	га	100	5,1	Лазер	самопод.	1	VI	9,56	1	IV	0,67	70	1,4	8,6	11,4	956,4	66,5	1022,9	1,3	130	3406,0	4429			
Транспортування води і оргунолії	т	160		ГАЗ-53		1		7,26				погод.	1,4	8,6		62,2		62,2		25	655,0	717			
Внесення інсектицидів	га	100	5,1	Лазер	самопод.	1	VI	9,56	1	IV	0,67	70	1,4	8,6	11,4	956,4	66,5	1022,9	1,3	130	3406,0	4429			
Збирання врожаю	га	100		Джон-Дір		2	VI	57,59				15,5	6,5	103,2		11517,9		11517,9		830	21746,0	33264			
Транспортування зерна	т	444,2		ГАЗ-53		2		7,26				погод.	6,5	103,2		1498,8		1498,8		333	8727,5	10226			
Очистка зерна	т	444,2		Пелюс		1	V	68,38	4	III	4,62	11,7	38,0	303,7	1215	30372,3	8211,8	38584,1	МБГ-тод	3037	5952,4	44536			
Разом по культурі		169												745	1301	60889	8770	69659		3464	90760	111111			

Тех.карта 7.

Технологічна карта																							
Культура	Овнята пшениця	Норма висіву, кг/га	220	Прогрунник, л (Вігвак - 200#)	55	Урожайність, ц/га		Ватний збір, ц															
Сорт	Скаген	Всього насіння, т	22	Гербіцид, л (Тріна 0,5 л/га)	50																		
Попережник	соя	Система удобрення	N ₈₀ P ₄₀ K ₄₀ +N ₈₀	інсектицид, л (Бі-58 0,5 л/га)	75	зерна		41,8	4180														
Площа, га	100	Всього гудка, т	20	фунгіцид, л (Алато супер 0,5 л/га)	50																		
Перший строк сієви																							
Найменування робіт	Одним.	Обсяг робіт	Склад апарату			Обслуговуючий персонал			Норма виробітку			Кількість нормозмін		Затрати праці, люд-год		Оплата праці по тарифу на весь обсяг робіт, грн.			Разом витрат на оплату праці, грн.		Платне		Всього затрат, грн.
			у фіз. од.	в умов. га	трактори, автомоб.	с.ч.ч. машини	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	кількість	розряд роботи	Розцінка, грн/га	механізатори	інвалі	механізатори	інвалі	всього	Вартість, всього грн.					
																			трактористи-машиністи	робітники ручної праці	всього	на одроб.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Душення стріли в два сієли	га	200	53,9	T-150K	ДП-10	1	V	16,33				49	4,1	32,7		3265,6		3265,6	3	600	15720,0	18986	
Передпосівна культивация	га	100	39,7	T-150K	2КПС-4	1	V	26,49				30,2	3,3	26,5		2649,3		2649,3	4,5	450	11790,0	14439	
Просівування насіння	т	22		ПС-10		1	IV	75,01	2	III	5,07	8	2,8	16,5	33,0	1650,2	223,1	1873,2	кВт-год	165	323	2197	
Навантаження насіння і добрива	т	42		ЗП-60		1	V	9,41	2	II	0,56	85	0,5	4,0	7,9		47,3	кВт-год	40	77	125		
Транспортування насіння і добрива	т	42		ГАЗ-53		1		7,26				потра.	2,9	22,9		165,9		165,9		50	1310,0	1476	
Сівба з внесенням добрива	га	100	13,7	ХТЗ-170	(Great Field, Newell)	1	V	22,86	1	III	1,55	35	2,9	22,9	22,9	2285,9	154,5	2440,5	3,5	350	9170,0	11610	
Прийомування посівів	га	100	11,2	МТЗ-80	ЗКШ-6	1	II	16,00				50	2,0	16,0		1600,2		1600,2	1,9	190	4978,0	6578	
Воронування посівів насінні	га	100	26,7	T-150	СТ-21-БЗСС-1	1	V	17,78				45	2,2	17,8		1778,0		1778,0	1,5	150	3930,0	5708	
Транспортування добрива	т	9		ГАЗ-53		1		7,26				потра.	2,4	19,0		138,3		138,3		50	1310,0	1448	
Підкормлення 1-р.-0,9 ц/га	га	100	13,3	МТЗ-80	МБТ-900	1	IV	19,05				42	2,4	19,0		1905,0		1905,0	1,51	151	3956,2	5861	
Транспортування води і отрутохімікатів	т	80		ГАЗ-53		1		7,26				потра.	2,0	12,0		87,1		87,1		25	655,0	742	
Внесення гербіцидів та фунгіцидів	га	100	5,1	Ланг	самолет	1	VI	9,56	1	IV	0,67	70	1,4	8,6	11,4	956,4	66,5	1022,9	1,3	130	3406,0	4429	
Транспортування води і отрутохімікатів	т	160		ГАЗ-53		1		7,26				потра.	1,4	8,6		62,2		62,2		25	655,0	717	
Внесення інсектицидів	га	100	5,1	Ланг	самолет	1	VI	9,56	1	IV	0,67	70	1,4	8,6	11,4	956,4	66,5	1022,9	1,3	130	3406,0	4429	
Збирання врожаю	га	100		Джон-Дір		2	VI	57,59				15,5	6,5	103,2		11517,9		11517,9	8,3	830	21746,0	33264	
Транспортування зерна	т	438,9		ГАЗ-53		2		7,26				потра.	6,5	103,2		1498,8		1498,8		329	8624,4	10123	
Очистка зерна	т	438,9		Петрус		1	V	68,38	4	III	4,62	11,7	37,5	300,1	1200	30013,3	8114,8	88888	кВт-год	3001	5882	44010	
Разом по культурі		169												741	1287	60530	8673	69203		3460	90657	88888	

Тех.карта 8.

Технологічна карта																										
Культура	Овня пшениця	Норма висіву, кг/га	220	Пророщення, л (Вітавік - 200#Ф)	55	Урожайність, ц/га		Валовий збір, ц																		
Сорт	Даринка Київська	Всього насіння, т	22	Гербіцид, л (Піріа 0,5 л/га)	50																					
Попередник	соя	Система удобрення	№,ф,к,с,т №	інсектицид, л (Ві-58 0,5 л/га)	75	зерна		44,7																		
Площа, га	100	Всього туня, т	20	фунгіцид, л (Алізо супер 0,5 л/га)	50																					
Перший строк сієви																										
Найменування робіт	Одн.в.	Обсяг робіт		Сила агрегату		Обслуговуючий персонал						Норма виробітку		Кількість нормозмін		Заграти праці,		Оплата праці по тарифу на весь обсяг робіт, грн.		Разом витрат на оплату праці, грн.		Підплат		Всього затрат, грн.		
																люд-год						на одобр.			всього	
																кількість	розряд роботи					кількість	розряд роботи		кількість, л	всього
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
Душення сирни в два сієли	га	200	53,9	Т-150К	ДП-10	1	В	16,33				49	4,1	32,7		3265,6		3265,6	3	600	15720,0	18986				
Передпосівна культивация	га	100	39,7	Т-150К	ЗКШ-4	1	В	26,49				30,2	3,3	26,5		2649,3		2649,3	4,5	450	11790,0	14439				
Протручування насіння	т	22		ПС-10		1	IV	75,01	2	III	5,07	8	2,8	16,5	33,0	1650,2	223,1	1873,2	кВт-год	165	323	2197				
Навантаження насіння і добрив	т	42		ЗП-60		1	В	9,41	2	II	0,56	85	0,5	4,0	7,9		47,3	47,3	кВт-год	40	77	125				
Транспортування насіння і добрив	т	42		ТАЗ-53		1		7,26				потра.	2,9	22,9		165,9		165,9		50	1310,0	1476				
Сівба з внесенням добрив	га	100	13,7	ХТЗ-170	Орен.Пил. S4000	1	В	22,86	1	III	1,55	35	2,9	22,9	22,9	2285,9	154,5	2440,5	3,5	350	9170,0	11610				
Піднесення посівів	га	100	11,2	АПЗ-80	ЗКШ-6	1	II	16,00				50	2,0	16,0		1600,2		1600,2	1,9	190	4978,0	6578				
Воронування посівів насінні	га	100	26,7	Т-150	СТ-21+ВСС-1	1	В	17,78				45	2,2	17,8		1778,0		1778,0	1,5	150	3930,0	5708				
Транспортування добрив	т	9		ТАЗ-53		1		7,26				потра.	2,4	19,0		138,3		138,3		50	1310,0	1448				
Піднесення 1 р-0,9 ц/га	га	100	13,3	АПЗ-80	АПД-900	1	IV	19,05				42	2,4	19,0		1905,0		1905,0	1,51	151	3956,2	5861				
Транспортування води і отрутохімікатів	т	80		ТАЗ-53		1		7,26				потра.	2,0	12,0		87,1		87,1		25	655,0	742				
Внесення гербіцидів та фунгіцидів	га	100	5,1	Лави	самолет	1	VI	9,56	1	IV	0,67	70	1,4	8,6	11,4	956,4	66,5	1022,9	1,3	130	3406,0	4429				
Транспортування води і отрутохімікатів	т	160		ТАЗ-53		1		7,26				потра.	1,4	8,6		62,2		62,2		25	655,0	717				
Внесення інсектицидів	га	100	5,1	Лави	самолет	1	VI	9,56	1	IV	0,67	70	1,4	8,6	11,4	956,4	66,5	1022,9	1,3	130	3406,0	4429				
Збірвання врожаю	га	100		Джон-Дір		2	VI	57,59				15,5	6,5	103,2		11517,9		11517,9	8,3	830	21746,0	33264				
Транспортування зерна	т	469,4		ТАЗ-53		2		7,26				потра.	6,5	103,2		1498,8		1498,8		352	9222,7	10722				
Очистка зерна	т	469,4		Пелус		1	V	68,38	4	III	4,62	11,7	40,1	320,9	1284	32095,5	8677,8	40773,3	кВт-год	3209	6290,1	47063				
Разом по культурі			169											762	1370	62613	9236	71848		3483	91255	111111				